

ALOE

Médicament d'action limitée mais fidèle

Aloès du Cap : aloe ferox millefolium , arbustre commun d'afrique du sud poussant dans les terrains secs et brûlants

Le suc épaissi des feuilles est utilisé sec

Utilisation allopathique : laxatif ou purgatif

Mots clés

CONGESTION PORTALE , IRRITATION DU COLON , INCONTINANCE DES SELLES

TYPOLOGIE :

pas de typologie bien caractérisée , mais volontiers indiqué chez les sujets ayant une surcharge alimentaire (complète bien certains médicaments psoriques)

Sujets pléthoriques à faciès vultueux

PATHOGENESIE, ACTION GENERALE :

Irritation aigüe ou chronique de la muqueuse du gros intestin avec nombreux gaz et sécrétion muqueuse et gélatineuse

Pléthore veineuse et congestion passive des organes pelviens du système porte et secondairement du cerveau.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES :

Etiologies habituelles : abus alimentaire en général, de bière, d'huitres ou après refroidissement

Peu de symptômes psychiques caractéristiques : grande fatigue et aversion pour le travail intellectuel, n'aime pas se remuer. Mauvaise humeur, intolérance à la contradiction, « dépression » après excès.

Céphalée congestive frontale et sus orbitaire, pesanteur sur les yeux avec nausées obligeant à fermer partiellement les yeux ; < avec la constipation ; alternant avec lumbago et hémorroïdes

Douleur dans les yeux, rougeur des yeux, stries jaunes devant les yeux.

Colite aigüe, flatulente avec :



Selles aqueuses avec mucus gélatineux , impérieuses, en jet, < rapidement après avoir bu ou mangé, accompagnées de gaz brûlant et fétide et de gargouillement

Selle solide, pâteuse ou visqueuse

Selle le matin au réveil, après avoir mangé, en position debout, en urinant ou en expulsant un gaz.

Sensation de pesanteur dans le bas ventre et dans le rectum.

Rectite ou ano rectite : ténesme, mucosités, glaires , sang accompagné ou non de lombalgie

Tendance à l'incontinence des selles en lâchant un gaz ; petite incontinence fécale avec la miction, incontinence urinaire avec la selle ou l'émission de gaz ; insécurité sphinctérienne.

Défaillance et sueurs froides après la selle. (inconstant)

Hémorroïdes : brûlantes, douloureuses et sensibles au toucher

Procidantes, saillantes comme une grappe de raisin, bleuâtres, sanglantes

>par les applications froides

Avec brûlure de l'anus pouvant gêner le sommeil

Autres symptômes : (secondaires)

- lumbago alternant avec céphalée et hémorroïdes
- épistaxis au réveil
- coryza fluent l'après midi
- règles abondantes et en avance
- congestion prostatique
- douleurs des mollets et de la plante des pieds sur sol inégal

MODALITES :

- < - au réveil et après les repas
- par la chaleur
- par la bière
- par abus alimentaires
- par les médicaments à effets secondaires digestifs
- par les bains froids pour les hémorroïdes

INDICATIONS CLINIQUES :

Diarrhées d'origine diverses avec les signes caractéristiques du médicament

Hémorroïdes

Céphalées

NB : ne fonctionne pas bien dans les RCUH et Krohn.

COMPARAISONS :

Complète bien l'action de SULFUR et NUX VOMICA



AESCULUS : hémorroïdes, douleurs piquantes, pas d'incontinence, alternance rectum pharynx

MURIATIC ACID : hémorroïdes plus douloureuses

PODOPHYLLUM : prolapsus rectal et diarrhée, colopathie droite, beaucoup de gaz avec la selle, contexte de GEA ou poussée dentaire

RHEUM : diarrhée avec selles acides, mauvaise humeur, contexte de poussée dentaire

CHINA : diarrhée indolore, lientérique, moins impérieuse et pas gélatineuse, sensibilité de l'abdomen au toucher, avec asthénie, hypo TA, < après avoir mangé

GAMBOGIA : moins de gaz et moins chauds, selles verdâtres, pas de ballonnements, pas de chaleur à l'abdomen

POSOLOGIE

De 5 à 9 ch, 1 à 3 fois / j, médicament symptomatique et d'action limité donc espacer les prises dès amélioration et arrêter dès disparition des symptômes.

Dr Jacques Bourmaud