



## A L O E

Médicament d'action limitée mais fidèle

**Aloès du Cap** : *aloe ferox millefolium*,  
arbuste commun d'Afrique du Sud poussant dans les terrains secs et brûlants.  
Le suc épaissi des feuilles est utilisé sec

Utilisation allopathique : laxatif ou purgatif

### Mots clés

**CONGESTION PORTALE - IRRITATION DU COLON - INCONTINENCE DES SELLES**

### TYPOLOGIE :

Pas de typologie bien caractérisée, mais volontiers indiqué chez les sujets ayant une surcharge alimentaire (complète bien certains médicaments psoriques)  
Sujets pléthoriques à faciès vultueux

### PATHOGÉNÉSIE, ACTION GÉNÉRALE :

Irritation aigüe ou chronique de la muqueuse du gros intestin avec nombreux gaz et sécrétion muqueuse et gélatineuse  
Pléthore veineuse et congestion passive des organes pelviens du système porte et secondairement du cerveau.

### SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES :

**Étiologies habituelles** : abus alimentaire en général, de bière, d'huîtres ou après refroidissement

**Peu de symptômes psychiques** caractéristiques : grande fatigue et aversion pour le travail intellectuel, n'aime pas se remuer. Mauvaise humeur, intolérance à la contradiction, « dépression » après excès.

**Céphalée congestive** frontale et sus orbitaire, pesanteur sur les yeux avec nausées obligeant à fermer partiellement les yeux ; < avec la constipation ; alternant avec lumbago et hémorroïdes.

**Douleur dans les yeux**, rougeur des yeux, stries jaunes devant les yeux.

**Colite aigüe**, flatulente avec :

- Selles aqueuses avec mucus gélatineux, impérieuses, en jet, < rapidement après avoir bu ou mangé, accompagnées de gaz brûlant et fétide et de gargouillement
- Selle solide, pâteuse ou visqueuse.
- Selle le matin au réveil, après avoir mangé, en position debout, en urinant ou en expulsant un gaz.
- Sensation de pesanteur dans le bas ventre et dans le rectum.
- Rectite ou ano-rectite : ténesme, mucosités, glaires, sang accompagné ou non de lombalgie
- Tendance à l'incontinence des selles en lâchant un gaz ; petite incontinence fécale avec la miction, incontinence urinaire avec la selle ou l'émission de gaz ; insécurité sphinctérienne.
- Défaillance et sueurs froides après la selle. (inconstant)



**Hémorroïdes** : brûlantes, douloureuses et sensibles au toucher.  
Procidentales, saillantes comme une grappe de raisin, bleuâtres, sanglantes

> **par les applications froides**

Avec brûlure de l'anus pouvant gêner le sommeil

## Autres symptômes : (secondaires)

- lumbago alternant avec céphalée et hémorroïdes
- épistaxis au réveil
- coryza fluent l'après midi
- règles abondantes et en avance
- congestion prostatique
- douleurs des mollets et de la plante des pieds sur sol inégal

## MODALITÉS :

**Aggravé** > - au réveil et après les repas

- par la chaleur
- par la bière
- par abus alimentaires
- par les médicaments à effets secondaires digestifs
- par les bains froids pour les hémorroïdes

## INDICATIONS CLINIQUES :

Diarrhées d'origine diverses avec les signes caractéristiques du médicament  
Hémorroïdes  
Céphalées

**N.B. : ne fonctionne pas** bien dans les RCUH (rectocolite ulcéro hémorragique)  
et maladie de Crohn.

## COMPARAISONS :

Complète bien l'action de **SULFUR** et **NUX VOMICA**

**AESCULUS** : hémorroïdes, douleurs piquantes, pas d'incontinence, alternance rectum pharynx

**MURIATIC ACID** : hémorroïdes plus douloureuses

**PODOPHYLLUM** : prolapsus rectal et diarrhée, colopathie droite, beaucoup de gaz avec la selle, contexte de GEA ou poussée dentaire

**RHEUM** : diarrhée avec selles acides, mauvaise humeur, contexte de poussée dentaire

**CHINA** : diarrhée indolore, lientérique, moins impérieuse et pas gélatineuse, sensibilité de l'abdomen au toucher, avec asthénie, hypo TA, < après avoir mangé

**GAMBOGIA** : moins de gaz et moins chauds, selles verdâtres, pas de ballonnements, pas de chaleur à l'abdomen

## PRESCRIPTION

De 5 à 9 CH, 1 à 3 fois / j , médicament symptomatique et d'action limitée donc espacer les prises dès amélioration et arrêter dès disparition des symptômes .