



LES AMENORRHEES

*Les aménorrhées se définissent par l'absence de règles ou menstruations.
Elles sont soit primaires, soit secondaires.*

I – Les aménorrhées primaires

Le diagnostic d'aménorrhée primaire s'établit sur l'absence d'apparition de règles et repose sur un bilan comprenant un interrogatoire et un examen clinique à l'issue desquels certains examens complémentaires pourront être nécessaires.

- **L'interrogatoire** permettra de noter
 - l'âge de la jeune fille et de connaître l'âge de la puberté de sa mère et de ses sœurs
 - les premiers signes de puberté (croissance des seins, pilosité, acné)
 - l'existence de douleurs périodiques pouvant précéder les premières règles,
 - plus rarement évoquer un obstacle à l'écoulement menstruel
 - une variation anormale du poids, une galactorrhée
 - des antécédents médicaux : maladies aiguës et chroniques (primo-infection tuberculeuse, vaccinations, traitements médicaux en cours)
 - le comportement psychologique
- **L'examen clinique** permettra d'apprécier
 - le poids, la taille, la morphologie générale
 - la pilosité axillaire et pubienne
 - le développement mammaire
 - l'examen gynécologique qui sera à adapter en fonction de la situation personnelle de la patiente et qui associera une inspection des organes génitaux externe, un examen au spéculum si la patiente n'est pas vierge, et des touchers pelviens (vaginal et/ou rectal)

Les examens complémentaires seront à envisager en fonction de chaque situation. La courbe des températures est un examen toujours très utile et le frottis cervical s'il est réalisable pourra fournir des renseignements sur l'imprégnation oestrogénique.

Pour mémoire les autres examens à envisager peuvent être pour les principaux : les dosages hormonaux (FSH, LH, prolactine, oestradiol ...), une échographie pelvienne, l'hystérosalpingographie, une coelioscopie, une radiographie de la selle turcique, un caryotype...



- **Principales étiologies des aménorrhées primaires**
 - le retard pubertaire simple : caractères sexuels secondaires absents, recherche du caractère familial
 - les malformations de l'appareil génital, les synéchies d'origine tuberculeuse
 - les aménorrhées hypophysaires, tumorales
 - l'hyperplasie congénitale surrénalienne
 - les anomalies génétiques (Syndrome de Turner, pseudohermaphrodisme...)

II – Les aménorrhées secondaires / +++ Il faut toujours rechercher une grossesse.

- **L'interrogatoire** reprendra les questions évoquées précédemment mais recherchera dans les **antécédents personnels** (sur le plan gynécologique, l'étude des cycles menstruels, l'existence d'une aménorrhée transitoire, la contraception, les grossesses, les avortements, et plus largement les traitements médicaux et chirurgicaux), dans les **antécédents familiaux** la recherche d'une ménopause précoce chez une mère, une sœur et enfin précisera l'état actuel de la patiente en étudiant à travers l'interrogatoire homéopathique les symptômes, psychiques, physiques, leur modalités...

- **L'examen** physique et les examens complémentaires reprendront la démarche décrite dans le chapitre précédent.
- **Les principales étiologies des aménorrhées secondaires :**
 - Les aménorrhées d'origine « psychique » : secondaires à des stress répétés, un choc affectif, un régime amaigrissant, une anorexie mentale... bien que fréquentes, ce diagnostic ne doit être évoqué qu'après avoir éliminé une autre cause possible.
 - Les aménorrhées d'origine ovarienne : ménopause précoce familiale, kystes dermoïdes, polykystose ovarienne...
 - Les aménorrhées d'origine utérine : post-médicamenteuse après un traitement par progestatifs, synéchies du post-partum, curetage traumatique, d'origine tuberculeuse...
 - Les aménorrhées d'origine hypophysaire : les hyperprolactinémies, le syndrome de Sheehan (nécrose de l'hypophyse après un accouchement), tumeurs hypophysaires...

III – TRAITEMENT DES AMENORRHEES

Après avoir éliminé les aménorrhées relevant d'un traitement chirurgical ou endocrinien, il est possible de recourir à un traitement homéopathique individualisé. Nous allons étudier quelques remèdes homéopathiques à cet effet mais il ne faut pas oublier que le remède bien indiqué peut être à lui seul insuffisant et qu'il demande souvent à être complété par le remède de fond propre à la personne malade.



Il est important de garder en mémoire qu'en définissant bien le remède de fond, sa prise peut permettre de rétablir la situation.

- **Traitement des aménorrhées primaires**

PULSATILLA (Anémone pulsatile – Renonculacée)

Sur le plan psychique timidité habituelle, douce, affectueuse, émotivité fréquente, **peurs** (obscurité, endroits confinés, en étant seule), humeur larmoyante > **consolation**, hypersensibilité, tous les symptômes de **PULSATILLA** étant caractérisés par une grande variabilité, mais > **au grand air**. Sur le physique, **frileuse**, congestion veineuse avec peau froide et état cyanosé des extrémités, **absence de soif**, règles apparaissant tardivement. L'aménorrhée est associée à des coliques abdominales et des douleurs lombaires ; il existe une **leucorrhée jaunâtre ou verdâtre, épaisse, crémeuse et non irritante**.

CALCAREA CARBONICA (Carbonate de calcium)

Retard ou lenteur de développement, lymphatique, apathique, **nombreuses peurs et anxiété**. Sujets gras et mous avec **tendance à grossir**, d'une **frilosité extrême avec transpirations abondantes**, acides, à l'effort et en dormant, **désir irrésistible de sucreries**, de sel, < lait. La puberté est retardée mais les règles apparaissent souvent subitement chez la jeune fille, les règles sont en général abondantes, souvent en avance et peuvent être interrompue brutalement pour une raison quelconque, parfois par un bain froid ou s'être lavée à l'eau froide. Il peut exister une leucorrhée substitutive à la place des règles.

KALIUM CARBONICUM (Carbonate de potassium)

Personne caractérisée par une **grande maîtrise de soi et un sens marqué du devoir**, émotions ressenties à l'estomac (comme un coup). **Très frileuse**, pouvant présenter une tuméfaction des paupières supérieures, avec des **douleurs piquantes, lancinantes**, < **générale entre 2 et 4 heure du matin**. Très souvent indiqué à la puberté quand les règles s'établissent difficilement, l'aménorrhée étant accompagnée de douleurs abdominales piquantes. La leucorrhée est jaunâtre et peu irritante, une anémie avec asthénie peut être associée.

NATRUM MUTIATICUM (Chlorure de sodium – sel)

Sujet **sur la défensive, renfermé, prudent** (dans sa coquille), **ressasse les évènements désagréable du passé avec chagrin silencieux**, < **par la chaleur (soleil)**, < ou > en bord de mer, **désir de sel**. Remède de déminéralisation, des aménorrhées chez les jeunes filles anémiques au visage luisant, plus maigre du haut du corps malgré un bon appétit, avec une constipation opiniâtre, des céphalées, < **vers 10 heures du matin**, souvent déprimées et < **par la consolation**. Les règles sont variables, irrégulières, souvent abondantes, avec sensation de lourdeur dans le bas ventre, et si leucorrhée, elle est verdâtre, acide, irritante et pruriente.



SEPIA (Encre de seiche - Sépiidés)

Jeune fille présentant une **stase généralisée, frileuse**, apathique, indifférente, irritable et susceptible, > **par une occupation, un effort violent**, présentant une constipation avec congestion du petit bassin (**sensation de bearing-down**) et douleur irradiant vers le dos, < **avant, pendant ou après les règles**. Les règles sont remplacées par une leucorrhée jaunâtre, épaisse, un peu irritante et associée à des démangeaisons vaginales.

LYCOPODIUM CLAVATUM (Lycopode - Lycopodinée)

Jeune fille **manquant de confiance en elle**, < **les choses nouvelles**, les responsabilités, **autoritaire chez elle, latéralité droite**, (ou troubles de droite à gauche), **frilosité mais besoin de plein air**, appétit vite rassasié et associé à une constipation avec besoins inefficaces et **ballonnements de la partie inférieure de l'abdomen, désir de sucreries**, < de 16 h à 20 h et de 3 h à 4h. Le retard pubertaire est global avec aménorrhée et seins peu développés.

GRAPHITES (Graphite – plombagine)

Sujet **indécis avec lenteur de compréhension et difficultés de compréhension, vexé et surexcité pour des broutilles**, anticipe les difficultés, **exprime ses émotions et > en pleurant, frileuse**, tendance à l'obésité, constipation atonique et des **signes cutanés (excoriations, crevasses, indurations), latéralité gauche**. L'aménorrhée s'accompagne d'une leucorrhée blanchâtre, filante, excoriante, abondante le matin au lever. Les ovaires sont douloureux et les seins, froids, gonflés et sensibles au toucher.

BARYTA CARBONICA (Carbonate de baryum)

Jeune fille avec **retard de développement** se caractérisant par une **timidité pudique**, se tient cachée, indécise, < **par les étrangers, illusion que l'on se moque d'elle**, qu'on parle d'elle ou qu'on l'observe. Présente une **grande sensibilité au froid (amygdalite)**, mauvais développement d'un organe (surtout les organes génitaux), **sueurs fétides excoriante des pieds**, les règles apparaissent tardivement. Artériosclérose.

FERRUM METALLICUM (Fer)

Personne **désirant la solitude, irritable, intolérante au bruit et à la contradiction, humeur et circulation variable et irrégulière** (pâleur du visage avec apparition subite de **bouffées congestives au moindre effort, à la moindre émotion, au moindre mouvement, à la moindre douleur**), **frileuse**, désir de mouvement, > **mouvement lent**, agitation. Les règles sont remplacées par une leucorrhée blanchâtre avec prurit > eau froide.

CYCLAMEN (Cyclamen europaeum - Primulacée)

Personne **frileuse** (aversion pour le plein air), **chagrin silencieux avec désir de solitude**, anxiété (remords, culpabilité). La patiente présente des **migraines avec troubles visuels et troubles menstruels** ou gastriques (aversion et < **graisses**,



absence de soif), l'aménorrhée peut être associée à des troubles visuels caractéristiques (hémioptie horizontale supérieure), > **pendant les règles et le mouvement.**

SENECIO AUREUS (Séneçon orangé - Composée)

Jeune femme faible, pâle, anxieuse, < nuit (toux, transpiration, insomnie), > écoulements (sécrétions muqueuses, règles, selles), **lors de l'aménorrhée**, sensation comme si les règles allaient apparaître, sensation comme si le dos allait se casser, dysurie, écoulements vicariants (épistaxis, toux avec hémoptysie, leucorrhée), règles peu abondantes, irrégulières chez les femmes nerveuses, émotionnables.

BRYONIA ALBA (Bryone blanche - Cucurbitacée)

Sujet se caractérisant par la **peur de la pauvreté, parlant en permanence de leur travail**, présentant une **sécheresse des muqueuse avec soif pour de grandes quantités d'eau froide**, sujets au sang chaud (< chaleur et > froid), **douleurs piquantes lancinantes** (ovaire droit, seins, abdomen) < **mouvement, le matin au réveil et > repos, par la pression.** Aménorrhée des sportives, avec leucorrhée aqueuse, blanchâtre. Remède d'inflammation et de sécheresse de la muqueuse et de la peau.

ARISTOLOCHIA CLEMATIS (Aristolochie : aristo=meilleur, locheia=accouchement - Aristolochiacée)

Remède très proche de PULSATILLA sur le plan physique peut être plus de SEPIA sur le plan psychique. Erythrocyanose et veines distendues, leucorrhée aqueuse avec prurit vulvo-vaginal voluptueux. Règles absentes, de courte durée, en retard, avec état psychosomatique < avant et après les règles, **nettement > pendant les règles.** Jamais bien depuis la pilule, remède auquel penser avant tout autre devant retard ou insuffisance de règles.

MOSCHUS (Glande à musc du chevrotain mâle - Moschidés)

Aménorrhée sur terrain de « spasmophilie » avec **théâtralisme, fait semblant d'être malade, défaillance et vertiges**, la faiblesse étant plus ressentie au repos qu'au mouvement, hypersensibilité et exagération des manifestations émotives (évanouissement en public, pendant les rapports sexuels). Répartition irrégulière du sang avec **un côté chaud et un côté froid, frilosité et froideur en surface et sensation de chaleur interne.**

- **Traitement des aménorrhées secondaires**

Les médicaments cités dans le paragraphe précédent peuvent traiter les aménorrhées secondaires si le tableau clinique présenté par la patiente correspond aux caractéristiques du remède.

1 – AMENORRHEES DE CAUSE PSYCHIQUE



✓ Suite de peur, de frayeur

OPIUM (Latex du pavot somnifère - papavéracée)

Repli surtout après des chocs émotionnels ou physiques (frayeur, honte, reproches, vue d'un accident, traumatisme crânien, chirurgie), semble **non affecté par les impressions externes** ou bien fait preuve d'audace inconsidérée avec absence complète de peur, **somnolence, < chaleur et > froid, suppression de tous les écoulements sauf la transpiration**, l'aménorrhée s'accompagne parfois de vomissements fréquents, et parfois de délire avec hallucination, congestion de la face, de constipation sans besoins.

GELSEMIUM SEMPERVIRENS (Jasmin jaune - Loganiacée)

Sujet marqué par l'**anticipation, paralysé et lourd à la suite de peur**, de terreur (les muscles refusent de lui obéir), **manque de volonté avec lenteur de compréhension**, lourdeur et somnolence, visage rouge sombre, **absence de soif, < temps lourd ou étouffant, > miction abondante**. Après une frayeur chez une patiente impressionnable, tremblante, somnolente avec troubles de la vue, céphalée occipitale et absence de soif caractéristique.

ACONITUM NAPELLUS (Aconit napel – Renonculacée)

Affection soudaine, violente et douloureuse, peur intense de mourir avec nervosité et **agitation**, impossibilité de rester en place, **picotements fourmillant, < nuit vers minuit**, affection survenant **après exposition au froid sec** ou après frayeur, choc ou peur, durant l'aménorrhée le visage est rouge, chaud, congestif, la peau sèche, le pouls plein, dur, bondissant.

APIS MELLIFICA (Abeille – Apidés)

Douleurs aiguës, brûlantes ou piquantes et brûlantes, **< chaleur et > froid**, ovaralgies avec **œdème** de tout l'appareil génital, **latéralité droite** (de droite à gauche), sujets au sang chaud, jaloux, occupé vainement, remuant, sensation de pesanteur pelvienne à la date présumée des règles.

✓ Suite de chagrin, de déception sentimentale

IGNATIA AMARA (Fève de Saint Ignace – Loganiacée)

Affection **suite de déception** (conflit intérieur entre un idéal romantique et la réalité), **chagrin silencieux, émotions se traduisant de façon spasmodique** (courts sanglots, soupirs, tics autour de la bouche, morsure interne des joues, boule dans la gorge ...), **états contradictoires et alternants, sueurs de la face**, L'aménorrhée survient à la suite d'un chagrin, d'une émotion, d'une contrariété, céphalée en « clou », aversion pour la fumée de tabac, les fruits, < sucreries.

CASTOREUM CANADENSIS (Sécrétions glandes voisine appareil génital mâle du castor – Castoridés)

Proche d'IGNATIA, hyperexcitabilité sexuelle féminine, spasmes respiratoires et digestifs des spasmophiles, aménorrhée chez les femmes nerveuses et asthéniques avec



tympanisme abdominal.

< **pendant les règles** (irritabilité, soif brûlante et insatiable, céphalée frontale),
> **pression forte, chaleur, plié en deux** (dysménorrhées avec violentes douleurs abdominales).

ACTAEA RACEMOSA ou **CIMICIFUGA** (Renonculacée)

Aménorrhée survenant après une émotion même minime (soupirs, tristesse), sujet extraverti, loquace (gentil, non caustique), **peur de devenir folle, frileuse mais > plein air**, leucorrhée blanchâtre, abondante, non corrosive, les **douleurs menstruelles proportionnelles à l'abondance des règles** persistent à minima après l'arrêt de l'écoulement, **douleur de nuque** (tension, raideur, douleur), endolorissement musculaire après effort avec insomnie.

✓ Suite de vexation, de colère

STAPHYSAGRIA (Staphysaigre, Herbe aux poux – Renonculacée)

Emotions refoulées chez des personnes dociles, douces, soumises, **pensées sexuelles envahissant l'esprit**, la poussant à la **masturbation**, < sieste de l'après midi, **hypersensibilité au toucher**. Après vexations répétées, colères rentrées, aménorrhée avec cystalgies.

CHAMOMILLA (Camomille, Matricaire – Composée)

Personne présentant une **irritabilité excessive** avec **aversion à ce qu'on lui parle et à ce qu'on la touche**, hypersensibilité et désespoir à la suite de douleur, **douleur intolérable, transpiration très chaude, engourdissement**, soif, **diarrhée avec selles vertes**, chaudes, acides à odeur d'œufs pourris, < **café**, < **colère**, < **au début et pendant les règles**. Après forte colère, chez une femme irritable, capricieuse, l'aménorrhée s'accompagne d'une leucorrhée jaunâtre, irritante, pruriente avec une dysménorrhée persistant malgré l'arrêt des règles.

COLOCYNTHIS (Coloquinte – Cucurbitacée)

Emotions refoulées (colère, vexation) entraînant des **affections physiques** (coliques et douleurs névralgiques), **la douleur la met en colère** (cris, hurlements, déformation du visage, larmoiement), **douleur suivie d'engourdissement**, douleurs et diarrhée, **douleurs névralgiques paroxystiques > en se pliant en deux, pression forte, chaleur**, latéralité droite. Aménorrhée accidentelle suite à une colère, une indignation. Douleurs ovariennes, abdominales > hyper flexion forcée.

✓ Suite d'un syndrome dépressif

L'aménorrhée est le premier symptôme pouvant faire évoquer une anorexie mentale chez la jeune fille.

NATRUM MURIATICUM

Aménorrhée chez une femme déminéralisée, émotive, dépressive, < consolation et préférant s'isoler, la dépression < vers 10 heures du matin.



PHOSPHORICUM ACIDUM (Acide phosphorique)

Personne trop **ouverte et impressionnable** (sensible à toutes les influences externes, acuité des sens),

compatissante, affectueuse, avec de **nombreuses peurs et anxiétés, désir et > boissons froides, chaleur brûlante (mains, remontant dans le dos)** et douleurs en des endroits limités, **< allongé sur le côté gauche et > sommeil même court**. Aménorrhée chez une femme dépressive devenue indifférente à tout, suite à un chagrin prolongé ou un travail ayant demandé beaucoup d'énergie et de passion, diminution de la mémoire, asthénie matinale, désir de s'isoler.

SEPIA Dépression faite d'indifférence, d'irritabilité envers les siens, de pessimisme, de découragement.

HELLEBORUS (Hellébore noir ou Rose de Noël – Renonculacée)

Stupeur, avec indifférence et lourdeur intellectuelle, > forte concentration, les perceptions sensorielles sont émoussées, frilosité et froideur, < 16h-20h, troubles cérébraux (après commotion, chirurgie cérébrale, pendant la fièvre), anurie. Dépression avec isolement, lenteur, **< consolation et apparaissant après une aménorrhée.**

CAUSTICUM (Causticum d'Hahnemann)

Dépression chez femme hypersensible aux malheurs des autres mais gardant un esprit très critique, **ne peut tolérer l'injustice, difficultés avec le pouvoir (idéaliste ou révolutionnaire), paralysies progressives, > petites gorgées d'eau froide, envies de choses salées, de viande fumée, douleurs brûlantes comme à vif. Règles ne coulant que le jour et remplacées par une leucorrhée la nuit.**

AURUM METALLICUM (Or)

Sens exagéré du devoir (se fait des reproches, culpabilité, tendance suicidaire en silence), hypersensible aux influences extérieures, **gros et brusques accès de colère et de violence**, chez une jeune femme hypertendue, pléthorique (congestion, visage rouge, bouffées de chaleur), **< la nuit (après le coucher du soleil)**

II – AMENORRHEES DUES A UNE CAUSE PHYSIQUE EXTERIEURE

- ✓ Après exposition au vent froid et sec

ACONIT Aménorrhée pouvant être associée à une **crise d'angoisse et sensation de mort imminente**

- ✓ Après exposition au froid humide

DULCAMARA (Douce-amère – Solanacée)



Aménorrhée avec seins durs, congestionnés, alternance de diarrhée et d'éruptions sur les grandes lèvres. **Suppression d'écoulement (règles) après refroidissement, temps humide, air froid.**

✓ Après avoir mis les mains dans l'eau froide

LAC DEFLORATUM (Lait écrémé)

Aménorrhée avec céphalée battante, nausées, vomissements et constipation opiniâtre.

CONIUM MACULATUM (Grande ciguë – Ombellifère) Aménorrhée, sujette aux vertiges, indurations mammaires, kystes ovariens, fibrome, syndrome prémenstruel.

✓ Après un bain froid

ANTIMONIUM CRUDUM (Trisulfure d'antimoine)

Aménorrhée souvent l'été après un bain froid, où les règles sont remplacées par une leucorrhée liquide, blanchâtre, associées à des signes digestifs (langue blanche, nausées, soif, selles mi-solides, mi-liquides)

CALCAREA CARBONICA Aménorrhée survenant chez jeune femme plutôt obèse.

PULSATILLA Aménorrhée avec leucorrhée crémeuse revenant régulièrement et durant 3 à 4 jours.

✓ Après suppression de sueurs des pieds

CUPRUM METALLICUM (Cuivre) Aménorrhée, leucorrhée irritante, chez une femme sujette aux crampes, aux spasmes et parfois aux crises d'asthme.

SILICEA (Silice)

Femme déminéralisée, frileuse, amaigrie, l'aménorrhée apparaissant après la suppression de sueurs aux pieds fétides et abondantes. Leucorrhée blanche, aqueuse, corrosive, brûlante et pruriant.

III – AMENORRHEE ET MENOPAUSE PRECOCE

CONIUM MACULATUM

L'aménorrhée apparaît vers 35 à 40 ans **suite à une continence sexuelle prolongée**. Il existe une congestion mammaire avec **mastopathie** ou mastose plutôt droite, une leucorrhée corrosive, laiteuse, des élancements douloureux des ovaires. **Vertiges fréquents** dans toutes les positions mêmes couchées, sueurs en s'endormant.

LACHESIS (venin de Lachésis muet ou sururucu)



Médicament classique de la ménopause pouvant être utile chez une femme avec aménorrhée après un choc affectif (deuil), **< par la chaleur sous toutes ses formes, le matin au réveil, par la constriction et le contact**, présentant des douleurs de l'ovaire gauche, une leucorrhée verdâtre, des bouffées de chaleur et une logorrhée caractéristique.

ZINCUM METALLICUM (Zinc)

Comme LACHESIS **< par arrêt des règles**, douleurs de l'ovaire gauche, prurit vulvaire, excitation sexuelles survenant chez une femme épuisée nerveusement.
Agitation constante des pieds, < de tous les symptômes par l'absorption de vin.

GLONINUM (Trinitrine)

Aménorrhée brutale chez une femme hypertendue avec céphalée battante occipitale.

VERATRUM VIRIDE (Ellébore vert – Liliacée)

Proche de GLONINUM par son action congestive violente généralisée, palpitations transmises à tout le corps, céphalées, bouffées de chaleur et **aménorrhée avec sensation de lourdeur dans le périnée.**

SANGUINARIA CANADENSIS (Sanguinaire – Papavéracée)

L'aménorrhée survient chez une femme sujette à l'hyperménorrhée avec migraines droites périodiques (week-end) et entraîne des douleurs abdominales, un gonflement mammaire, une leucorrhée irritante et des bouffées de chaleur avec rougeur circonscrite des joues.

IV – AMENORRHEE ASSOCIEE A UN UTERUS FIBROMATEUX

THUYA OCCIDENTALIS (Cèdre blanc, arbre de vie)

Sensation de laideur à l'intérieur, d'être impossible à aimer, **< temps froid et humide**,
écoulements verts ou jaune vert, **< des idées fixes et des obsessions en cas d'aménorrhée**,
vagin sensible et douloureux pendant les rapports sexuels. **Tendances aux verrues, condylomes...**

GOSSYPIUM (Malvacée)

Aménorrhée accompagnée d'une toux spasmodique, sensation de pesanteur pelvienne avec douleur vive au mouvement et ovaralgies intermittentes.

V – AMENORRHEES AVEC ECOULEMENTS « VICARIANTS » *(Se dit d'un organe ou d'une fonction qui supplée à l'insuffisance d'un autre organe ou d'une autre fonction)*

✓ Avec saignements



Après avoir éliminé une tuberculose, pourront être évoqués

PHOSPHORUS (Phosphore blanc) Aménorrhée dans un **contexte fébrile avec toux et hémoptysie.**

SENECIO AUREUS Epistaxis et hémoptysie remplacent les règles chez une femme anémiée et épuisée.

FERRUM METALLICUM Anémie, épistaxis et aménorrhée

BRYONIA ALBA Aménorrhée après exercice violent avec épistaxis vicariante.

MILLEFOLIUM (Millefeuille – Composée)

Anémie avec douleurs abdominales et épistaxis chez une malade sujette habituellement aux hémorragies.

- ✓ Avec toutes sortes d'écoulements (leucorrhées, rhinite, sueurs, diarrhée ...)

LACHESIS MUTUS > par l'apparition de l'écoulement quel qu'il soit.

SULFUR (Soufre)

Médicament principal de toutes les alternances pathologiques, il sera prescrit sur les signes généraux, les règles sont en général peu abondantes, retardées, cessant brutalement le 3ème jour.

EUPHRASIA (Euphrase, Casse-lunettes – Scrofulariacée)

Aménorrhée avec **catarrhe oculo-nasal, larmoiement aqueux irritant.**

- ✓ Aménorrhée et galactorrhée

CYCLAMEN

Femme anémiée, scrupuleuse, perfectionniste, dépressive, larmoyant et refusant le contact, l'aménorrhée s'accompagnant de céphalée et parfois de galactorrhée. Proche de PULSATILLA.

RICINUS COMMUNIS (Ricin – Euphorbiacée)

Aménorrhée et galactorrhée, remède associant une diarrhée très abondante, indolore, déshydratante, cholériforme.

PULSATILLA

Aménorrhée des jeunes filles ayant une puberté tardive ou survenant suite à un bain pendant les règles ou après avoir eu les pieds mouillés

BORAX (Borate de sodium)



Homéopathes Sans Frontières

FRANCE Ouvrir à tous l'accès aux soins

Galactorrhée mais pas d'aménorrhée, remède de leucorrhée, de dysménorrhée.
Aptes, peur des descentes, leucorrhée comme du blanc d'œuf cru, donnant la sensation de couler comme de l'eau chaude, irritante.

Docteur Bruno PRUDHOMME - HSF France - 2007