

ANTIMONIUM TARTARICUM

Poudre cristalline blanche, inodore, de saveur métallique

Les mots clés : **DYSPNEE** **MUCUS ABONDANT**
EXPECTORATION IMPOSSIBLE

TYPOLOGIE

Le remède sera indiqué dans les modes réactionnels cliniques regroupant

ABATTEMENT

PÂLEUR

SOMNOLENCE

- **Psychisme**

Sujets apathiques, indifférents à tout, même à la mort, mais pouvant être très anxieux dans les paroxysmes respiratoires; ou facilement agacés et demandant à être seuls; de mauvaise humeur et gémissant; perdant conscience dès qu'ils ferment les yeux. Parfois, atteints de délire marmottant ou furieux.

- **Type sensible (ou physique)**

Faible réaction vitale, individus usés; enfants et vieillards

Visage dans les états aigus : Pâle, creusé, avec yeux cernés; enfoncés; cyanosé avec lèvres livides; froid et en sueur, narines dilatées; soubresauts des muscles du visage; tremblement constant de la mâchoire inférieure.

Enfants de mauvaise humeur; ne voulant pas être touchés et qu'on leur parle, pleurnichant et gémissant; le jeune enfant demande à être porté dans les bras; le nourrisson doit quitter le sein pour cause de **suffocation**.

PATHOGENESIE/ACTION GENERALE

- **L'intoxication provoque**

Antimonium tartaricum porte son action élective sur le système nerveux, sur les muqueuses, sur la peau.

Dans la sphère cérébro-spinale, il développe une dépression paralytique avec disparition des réflexes et diminution de la force musculaire.

L'action du remède sur le nerf pneumogastrique engendre un état nauséux, des vomissements, des phénomènes cholériformes, une dyspnée asphyxique, une asthénie

- **L'expérimentation**

Action prédominante sur la muqueuse respiratoire : il est à l'appareil respiratoire ce qu'Antimonium Crudum est à l'appareil digestif ; il produit des **sécrétions bronchiques abondantes, d'un mucus épais, difficile à expulser**

Action secondaire sur la peau où il provoque des éruptions varioliformes avec parfois des cicatrices bleuâtres indélébiles



SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

- **Symptômes généraux**

Convulsions par mauvaises sorties éruptives (varicelle, variole, etc.)
Tremblement général très fort, surtout des mains et de la tête.

Maladies aiguës commençant par des troubles digestifs.

Somnolence accompagnant beaucoup de troubles, augmentée par la chaleur.

Peau couverte d'une sueur ruisselante et collante. Moiteur de la paume des mains. Mains froides, bout des doigts glacé

- **Tête**

Etat de confusion et engourdissement de la tête. Céphalée aggravée pendant le repos, dans la position étendue, **améliorée en étant assis** droit. **Sensation d'un bandeau serré sur le front.**

- **Yeux**

Étincelles et flammes devant les yeux. Inflammations oculaires avec **conjonctives pâles**. Yeux proéminents, brillants dans la pneumonie.

- **Digestion**

Langue épaisse, pâteuse, flasque; blanche avec papilles transparaissant et bords rouges; ou bien portant des raies rouges; ou très rouge et sèche au milieu.

Eructations à goût d'œuf pourri. **Nausées continues avec anxiété mortelle et prostration, sueurs au front**, nausées ressenties dans la poitrine; améliorées par les vomissements. Vomissements avec beaucoup d'efforts prolongés jusqu'à produire l'**évanouissement**, accompagnés de **tremblements des mains, vomissements de mucosités épaisses, filantes; suivis de somnolence.**

- **Appareil respiratoire**

Gros râles humides dans la poitrine, surtout au moment de la toux. **Oppression dans la position étendue; avec narines dilatées, besoin d'être éventé**; suffocation aggravée de 3 à 4 h. du matin; dyspnée très aggravée par la suppression de l'expectoration, **très améliorée par l'expectoration** et les éructations. Expectoration fade, douceâtre, mucus blanchâtre, épais, filandreux. Toux grasse avec **expectoration très difficile ou impossible**, toux suffocante; on doit s'asseoir dans son lit pour tousser; toux accompagnée de tremblement de la tête; toux aggravée par les boissons chaudes. Alternance de toux et de bâillements. Toux chez l'enfant dès qu'il se met en colère, avec soubresauts des muscles du visage. Les accès de toux chez l'enfant sont précédés de pleurs, viennent après avoir mangé ou bu, sont suivis de **somnolence**.

MODALITES

- **Aggravation**

Par la chambre trop **chaude**, le temps chaud, humide; étant trop **chaudement** vêtu; par les bains froids. Par la position horizontale; étant **couché**. Le matin.

- **Amélioration**

En se dressant de la position couchée à la position **assise**; par le mouvement; par l'**expectoration**, les éructations.

- **Causalités (suite de)**



Temps humide; séjour dans les sous-sols et les caves humides; vaccination jennérienne.

- **Désirs et aversions**

Dégoût de la nourriture, du lait; désir d'acides, de pommes, d'aliments rafraîchissants; habituellement absence de soif; disparition de l'envie de fumer

- **Sensations**

Douleurs tranchantes, en coup de canif; de tremblement intérieur; de froid dans les vaisseaux.

- **Excrétions**

Catarrhales muqueuses, blanches, visqueuses et filantes.

- **Concomittances**

Faiblesse et relâchement général; manque de réaction. Etat nauséux; bâillements. Somnolence. Peau froide et transpirante. Mains tremblantes.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

- **les affections respiratoires**

Mucosités bronchiques, expectoration impossible

Gros râles humides à l'auscultation

Respiration difficile et bruyante

Expectoration minime ou impossible : asthme très sécrétant et peu productif

Dyspnée intense aggravée en étant allongé, de 3 à 4h du matin. Cyanose et **battements des ailes du nez**. Nausées, vomissements. **Langue chargée**

Somnolence, réagit peu aux sollicitations, confus. Sueurs froides, précollapsus

- **les indications cutanées**

Pustules **varioliformes**, acné pustuleuse, impétigo

COMPARAISONS

Ipeca a des râles aussi importants mais l'expectoration se fait mieux. La toux est émétisante. La langue est propre ou peu chargée

POSOLOGIE

Prescription : 9 voir 15CH ou 200K à répéter aussi souvent que nécessaire lorsque l'amélioration a cessé

Dr Françoise SAINT-DIDIER