



Les ARAIGNÉES

I Symptômes communs (selon Dr Agnès FLOUR)

Rapidité

Cet animal est d'une rapidité incroyable
Elles sautent, elles peuvent faire des bonds de un mètre

Musique

Les araignées chantent et dansent, quelles que soient les espèces, pendant leur parade amoureuse.
En frottant leurs pattes sur certaines structures de leurs corps, elles produisent un chant.
Chaque espèce d'araignée produit sa propre chorégraphie.

Jeûner

Elles peuvent faire un très gros repas et ensuite jeûner pendant des mois.
Ça n'avale pas, ça malaxe et n'ingère que du jus.

La toile

Toutes les araignées ont des glandes séricigènes produisant de la soie, mais toutes ne l'utilisent pas. Tarentula peut tisser mais elle peut ne jamais tisser de toute son existence.
Ce sont des arthropodes. Elles n'ont pas d'antennes, elles sont sensibles par leurs poils. Plus proche des scorpions que des insectes. Le cannibalisme est banal chez les araignées.

II Les araignées étudiées par l'homéopathie

A. Les mygales

Mygale veut dire « petit animal velu ». Elles sont de mauvaises tisseuses, elles se capitonnent un nid, mais ne font pas de belles toiles pour attraper des insectes.

1) ATRAX ROBUSTUS

Mygale de Sydney. C'est la seule espèce connue qui produise un venin auquel l'homme soit le plus sensible alors qu'il n'est pas une proie pour l'araignée. L'homme est une victime accidentelle. La mygale mâle peut tuer un homme avec son venin.

2) MYGALE LASIODORA

Leur venin n'est pas très toxique, mais elles ont des poils urticants à l'abdomen, et elles vous lancent le produit qui irrite les yeux et fait saliver. La plupart se trouvent au Brésil ou à Cuba; elle mesure 6cm de long. C'est sur celle-ci qu'a été étudiée la pathogénésie

Caractéristiques

Agitation avec délire. **Chorée affectant surtout le haut du corps et le côté droit**, calmée pendant le sommeil, aggravée le matin. Soubresauts (**tics**) des muscles du visage et de la tête



qui est inclinée latéralement par des spasmes; la bouche et les yeux s'ouvrent et se ferment en alternance rapide. Difficulté de porter la main à la tête, à la bouche. Visage chaud et rouge. Élocution saccadée. Céphalée frontale, irradiée aux yeux, d'une tempe à l'autre. Langue desséchée, le sujet la sort difficilement. Grande soif. Grincement des dents la nuit. Nausées accompagnées d'obscurcissement de la vue, de fortes palpitations. Urine brûlante et piqûres dans l'urètre. Excitation sexuelle avec érections violentes. Démarche instable. Les membres se traînent en marchant. Tout le corps est constamment en mouvement. Agitation des mains. Mouvements incontrôlables et convulsifs des bras et des jambes.

Psychisme: Délirant, agité, triste, craint la mort, découragé.

Modalités: Amélioration pendant le sommeil. Aggravation le matin.

3) TARENTULA CUBENSIS

Il semblerait que cet animal était «citharacanthus spinicrus», une mygale de Cuba.

Caractéristiques

États septiques provenant d'inflammations locales, avec invasion générale rapide, grande prostration, **douleurs atroces de brûlures** et de piqûres, **dureté** de bois des parties enflammées; sueur abondante. **Couleur bleuâtre pourpre** des régions enflammées. Tremblement des mains qui sont gonflées de sang, agitation nerveuse des pieds. Anthrax, panaris, suppurations, phlegmons, septicémie, gangrène, furoncles avec douleurs brûlantes, et piquantes. Teint violacé.

Diphthérie grave.

Psychisme

Agitation nerveuse analogue à celle de Tarentula Hispanica (cf. plus loin)
Angoisse de l'agonie.

Modalités

Aggravation par les boissons froides, par l'exercice.
Amélioration, en fumant. **Aggravation** la nuit.

B. Les araignées vraies: 95% des araignées

Elles vivent entre un et trois ans.

Les mâles vadrouillent pour chercher les femelles. Ils sautent, ils dansent et ils chantent. Ils meurent après la fécondation. Les femelles peuvent jeûner pendant des mois.

● Les lycoses

Elles chassent en poursuivant la proie de nuit, elles voient bien.

Elles ne sont pas de bonnes tisseuses. Elles restent toujours sur le sol, elles ne grimpent pas.

Les tarentules sont des lycoses.



TARENTULA HISPANICA

TARENTULA HISPANICA (Tarentula lycosa : «araignée loup») vit sur le pourtour méditerranéen. Une grosse araignée, jusqu'à 3 cm, qui chasse au sol en courant.

Dos grisâtre, ventre jaune safran avec une bande transversale noire.

Elle est unique au monde parce qu'elle porte sur son dos ses petits après éclosion.

C'est une vraie «mère poule». Elle les nourrit et les protège jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus être sur son dos (une cinquantaine). Les lycoses sont gentilles sauf quand elles ont des petits sur le dos. Les morsures de lycose qui ont nécessité un traitement, sont survenues chez des gens qui ont embêté des lycoses avec leurs petits sur le dos.

D'habitude, quand deux araignées femelles se rencontrent et se battent, la plus forte mange l'autre et aussi les petits de l'araignée vaincue.

Tarentula lycosa elle, va adopter les petits de l'araignée vaincue.

***** En réalité, la pathogénésie qu'on a appelé «Tarentula» a été faite avec la **veuve noire méditerranéenne à 13 points** = LATRODECTUS MACTANS tredicinguttatus.**

*Dans une expérimentation (Dr Pierre Lenthalic) avec la vraie Tarentula lycosa, 4 expérimentateurs ont fait le même rêve: **rêve d'enlèvement d'enfants**.*

On leur arrachait leurs enfants. C'est le vrai symptôme clef de la vraie Tarentula Hispanica qui nourrit et protège ses enfants. (Dr Agnès Flour)

Caractéristiques

Délire violent avec chants, **danse**. Dans l'**agitation anxieuse** le malade **roule sa tête d'un côté à l'autre**, bouge constamment ses membres. **Céphalée aggravée** par la lumière, le bruit, le toucher; **sensation** d'aiguilles dans le cerveau, de coups de marteau dans l'occiput.

Toucher l'épine dorsale cause des spasmes respiratoires et cardiaques douloureux.

Toux nerveuse : aggravée ou améliorée par le tabac, toux après le coït. Suffocations brusques, **sensation** de torsion du cœur, d'arrêt du cœur. Incontinence d'urine en toussant, riant, bougeant (femmes). Éréthisme sexuel qu'on ne veut pas dominer. **Excitation sexuelle** chez la femme augmentée après le coït. Grande sensibilité des régions sexuelles féminines et prurit vulvaire intolérable. **Agitation continue des membres avant de s'endormir le soir**. Sueur abondante en entendant de la musique.

Psychisme

Sujet alternant de la gaieté à la tristesse (qui domine), de la douceur calme à la violence subite. Très impressionnable, pleurant quand on le console, peureux imaginaire, intolérant de certaines couleurs, hystérique, kleptomane : **malade hypernerveux, agité, mobile, agitant continuellement ses membres, éprouvant le besoin de marcher quoique la marche l'aggrave**. Femmes réglées trop tôt et abondamment; excitées sexuellement pendant les règles et souffrant alors d'une grande sécheresse de la gorge, aggravées après les règles.



Modalités

Aggravation

par le froid humide, le bruit, le contact des régions malades, la marche, après les règles.

Amélioration par la musique (qui peut d'abord exciter),

dans le silence et l'obscurité, par une friction douce.

*** *Donc si les symptômes sont évocateurs de Tarentula Hispanica et que le remède ne marche pas, penser à donner le remède LATRODECTUS MACTANS TREDECIMGUTTATUS.*

● Les veuves: LATRODECTUS

La caractéristique, c'est la position sur la toile. Ce sont des toiles en désordre avec des fils qui vont partout ; elles se tiennent sous la toile le ventre tourné vers le ciel.

Les veuves ont des dessins rouges magnifiques

1) La veuve noire américaine : LATRODECTUS MACTANS

Elle produit beaucoup de petits. 3 couleurs dominantes : noire, rouge et orange. Latrodectus mactans américaine se cache sous les cuvettes de WC parce qu'elle il trouve la fraîcheur.

Caractéristiques

Intensité des douleurs de morsure, au niveau du muscle, à **rendre fou**.

La piqûre a des effets **tétanisants** qui persistent pendant plusieurs jours. L'action du remède présente le **tableau de l'angine de poitrine**. La région précordiale semble être le centre de la crise. Constriction des muscles pectoraux avec irradiation vers les épaules et le dos.

Hémorragies de sang aqueux, incoagulable

Céphalées occipitales. Douleur allant du cou à l'arrière de la tête.

Apnée extrême. Respiration entrecoupée.

Crises de suffocation avec peur de ne plus pouvoir reprendre son souffle et de mourir.

Violente douleur précordiale irradiant vers l'aisselle, dans le bras et l'avant-bras, vers les doigts, avec engourdissement de l'extrémité, aggravées par le moindre mouvement, le seul mouvement des mains.

Pouls faible et rapide. **Sensation de défaillance**. Douleur dans le bras gauche, qui semble paralysé. Faiblesse des jambes suivie par des crampes dans les muscles abdominaux.

Paresthésie des membres inférieurs.

Toute la peau du corps est froide. **La peau a la froideur du marbre**.

Nausées suivies d'une forte douleur dans l'abdomen.

Psychisme

Angoisse. Cris de douleur.

Le sujet a peur de manquer d'air. Irritabilité, agitation anxieuse.

Rêves de s'envoler.



Modalités

Aggravation : par le moindre mouvement, même celui des mains; par l'effort et en parlant.

Amélioration : en étant assis tranquillement.

2) Theridion curassavicum Araignée orange

(Il semblerait que «Theridion curassavicum» soit en fait «Latrodectus variolus», une «veuve» sud-américaine).

Caractéristiques

Sensibilité de l'épine dorsale à la pression, à la palpation entre les vertèbres. **Vertige en fermant les yeux et par tout bruit.** Céphalée avec sensation de pression derrière les yeux, céphalée avec vertige nauséeux. Céphalée aggravée par la chaleur du soleil, par le bruit, par tout ébranlement, céphalée en commençant de bouger. **Hyperesthésie auditive** : tout bruit pénètre le corps jusqu'aux dents et provoque nausée et vertige. **Nausée aggravée en fermant les yeux et par tout mouvement.** Dents très sensibles à l'eau froide. Élancements douloureux dans le thorax gauche s'irradient au dos, à l'épaule gauche; anxiété cardiaque.

Psychisme

Sujets très nerveux et **hypersensibles, particulièrement au bruit**; agités nerveusement, devant **s'occuper constamment** à quelque chose quoique n'y trouvant aucun intérêt; agitant nerveusement les mains, les tordant; ayant la sensation étrange que la tête ne leur appartient pas, qu'ils peuvent la détacher du corps; sujets **facilement loquaces**, enclins à des crises d'hilarité; ayant l'impression que le temps passe trop vite; sentant leurs pensées s'évanouir en fermant les yeux, ce qui s'accompagne de nausées

Modalités

Aggravation par le bruit, le toucher, les secousses, l'ébranlement; en fermant les yeux.

Amélioration par le repos; par la chaleur. **Sensation** de fines piqûres; de brisement dans les os. **Désir** de fruits acides, d'oranges, de bananes, de vin et d'alcool; de fumer.

● Les aranéïdes: ÉPEIRES

ARANEA DIADEMA est la vraie bonne tisseuse, c'est elle «l'artiste».

Épeire diadème ou «araignée à croix papale».

Les petits se balancent au bout d'un fil qui peut mesurer plusieurs mètres, et se laissent emporter par le vent ailleurs. Elle chasse à l'affût.

Ce sont des animaux frileux, saisonniers, elles vont mourir avant l'hiver.

Les femelles pondent un millier d'œufs qu'elles vont placer dans un savant cocon car, pour que ces œufs éclosent au printemps suivant, il faudra qu'ils subissent un peu le froid.

Caractéristiques

Tous les symptômes d'Aranea sont caractérisés par la **périodicité et la froideur** ainsi que par une **grande sensibilité à l'humidité**.



Névralgie (trijumeau, dents, nerfs intercostaux) **aggravée** à minuit, et obligeant à sortir du lit; odontalgie soudaine et violente, la nuit dès que l'on s'est couché (mâchoire supérieure).

Névralgies **aggravées** au moment des règles et surtout avant;

améliorées par une forte pression.

Céphalée frontale, **améliorée** au grand air et en fumant.

Céphalée chronique précédée d'un vacillement devant les yeux et de vertige.

Saignement excessif des blessures, des plaies.

Sensation d'épuisement avec nécessité de se coucher.

Grande **lourdeur et plénitude du bas-ventre** et lourdeur des cuisses, avec une sensation de défaillance à l'estomac (**revenant à la même heure**).

Leucorrhée de mucus visqueux.

Douleurs osseuses térébrantes dans les membres.

Sensation, la nuit, que les mains et les avant-bras sont augmentés de volume et lourds.

Douleurs térébrantes aux tibias (droit), au calcaneum; ulcère au talon.

En se couchant, le contact des draps donne le frisson. **Insomnie à cause du froid glacial** des membres inférieurs qu'on ne peut arriver à réchauffer.

Accès de fièvre : frissons dominants ou prolongés, non soulagés par la chaleur extérieure; absence du stade de sueur; **accès revenant exactement à la même heure.**

C'est le remède des sujets sensibles à la malaria, pour lesquels chaque jour un endroit humide favorise les refroidissements. Le patient a froid jusqu'à la moelle des os.

Rien ne peut apaiser cette sensation de froid.

Sensation que certaines parties du corps sont hypertrophiées et pesantes.

Psychisme - Typologie

Sujets hypersensibles au **froid humide**, ayant constamment froid, jour et nuit, surtout par les temps de pluie, frissonnant au contact frais des draps de lit, avec incapacité de vivre au bord de l'eau, d'un lac, d'une rivière; très mobiles, ayant un besoin constant de bouger dans la position assise.

Déprimés moralement jusqu'au désir de la mort.

Femmes réglées en avance de 10 jours, abondamment et trop longtemps.

Modalités

Aggravation par l'**humidité**, le froid humide, les bains, la pluie, les séjours humides; à la fin de l'après-midi; à **minuit**.

Amélioration les jours ensoleillés ; par une forte pression (névralgies), au grand air, en fumant

Sensation de forte augmentation de volume des parties du corps; d'engourdissement; de froid glacial et de douleurs térébrantes dans les os (tibia, calcaneum).

Caractère **périodique** des troubles qui reviennent à la même heure exacte.



III « Noyau » : l'essentiel caractéristique

1) ARANEA DIADEMA

Froideur, ne peut se réchauffer, aggravation par le **temps humide**, sensations d'**agrandissement**, **périodicité** rigoureuse des affections, amélioration en fumant.

2) LATRODECTUS MACTANS

Agitation extrême, **angoisse**, **angor**, douleur à rendre fou, **froideur de marbre**, rêve de voler

3) MYGALE LASIODORA

Mouvements incontrôlables et convulsifs, **chorée affectant surtout le haut du corps**, tics

4) TARENTULA CUBENSIS États septiques

5) TARENTULA HISPANICA

Agitation extrême, se sent poussé à bouger, **amélioration par la musique**, par le rythme
Désir de plein air. **Roule la tête d'un côté à l'autre** pour trouver du soulagement.
Excitation sexuelle.

6) THERIDION CURASSAVICUM

Nervosité extrême, activité vaine sans résultat.

Le temps passe trop vite.

Hypersensibilité au bruit. Vertiges.

Forte envie d'oranges et de bananes

Aggravation en **fermant les yeux et par tout mouvement**

Dr Françoise SAINT-DIDIER

