

FERRUM PHOSPHORICUM= le phosphate de fer

Poudre gris bleu ou cristaux pratiquement insolubles dans l'eau, solubles dans les acides minéraux

Les mots clés : **ASTHENIE** **TENDANCE HEMORRAGIQUE** **CONGESTION**
LOCALE

TYPOLOGIE

Les sujets (surtout des enfants ou des adolescents fatigués) sont habituellement fragiles et vulnérables. Ils sont pâles, anémiques et saignent facilement

PATHOGENESIE/ACTION GENERALE

L'expérimentation a montré par la présence de l'ion Phosphore une augmentation de la tendance **hémorragique** et une **asthénie** par la présence de l'ion Fer

Due au Fer : phase d'excitation avec congestion puis phase de dépression, anémie

Due au phosphore : phase d'excitation avec agitation physique et mentale et hypersensibilité sensorielle. Tendance à faire des hémorragies. Très grande fatigabilité. Puis une phase de dépression cérébrale et physique avec anémie

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

La principale caractéristique est le MANQUE DE CARACTERISTIQUE

- la fièvre

dues à des **états congestifs**, à la chaleur du soleil, à des traumatismes

Modérée, autour de 38 à 38,5. De début récent ; le pouls est rapide mais souple et mou. Le visage présente des **alternances de rougeur et de pâleur** ; la peau est généralement moite (la transpiration fatigüe). Le malade est sujet aux **phénomènes hémorragiques** et en particulier aux **épistaxis** ; il présente des phénomènes de **congestion localisée** surtout aux oreilles et au niveau respiratoire. Les épisodes congestifs peuvent s'accompagner d'anxiété surtout la nuit

- les hémorragies

De sang **rouge, brillant**, qui ne soulage pas

Epistaxis, hémoptysie

- les céphalées

Battantes, la nuit



Tête chaude, **alternance rougeur et pâleur de la face**, **congestion** des pommettes

Calmées par les applications froides

- **les otalgies**

Douleurs battantes qui réveillent la nuit

Tympan **congestif**. Surdit  suite de rhumes (surtout chez les enfants)

- **les troubles digestifs**

Abdomen distendu, sensible   la pression, douloureux

Douleurs am lior es pendant et apr s la selle

Douleurs par acc s

Diarrh e aqueuse, brune, stri e de sang rouge, brillant, indolore

- **les troubles respiratoires**

Toux s che, spasmodique, tr s douloureuse (avec parfois incontinence d'urines lors d'acc s de toux)

Toux aggrav e   l'air froid, en position couch e

Sensation d'oppression

Expectoration volontiers **sanglante**

Laryngite des chanteurs avec sensation de chatouillement trach al et grande s cheresse de la gorge

- **les douleurs rhumatismales**

Localement articulations rouges, chaudes, peu enfl es

Douleurs aggrav es la nuit, par les mouvements, les efforts physiques, am lior es par la chaleur, les applications froides

Douleurs erratiques

Douleurs  paule droite, bras droit surtout

- **les troubles g nito-urinaires**

Incontinences urines diurnes et nocturnes, aggrav es par l'effort

Hyperm norrh es chez les jeunes filles ayant grandi trop vite (sang rouge et brillant)

MODALITES

- **Aggravation**

Nuit. Mouvement. Bruit. Secousses. Air froid

Suppression de la transpiration Effort physique. Apr s avoir mang . Debout

- **Am lioration**

Froid. Saignement. Pression. En se promenant lentement. Apr s le lever. Apr s la selle. Solitude

- **Causalit s (suite de)**

Suppression de la sueur.

- **Excrétions**
Sanguinolentes.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

Affection,s fébriles ou inflammatoires aux premiers stades.
Otites aiguës congestives.
Trachéites et bronchites.
Tendance aux épistaxis

COMPARAISONS

dans la fièvre

Les indications en fonction des signes de début de la fièvre

Ferrum Phosp : début insidieux, fièvre modérée, sujet en mouvement

Pulsatilla : début progressif, absence de soif, sujet en mouvement

Bryonia : début progressif, soif intense, sujet immobile

Aconit : début brutal, syndrome intense, agitation

Apis : début brutal, absence de soif, oedème

Belladonna : début brutal, moiteur, chaleur, battements, fièvre élevée

Gelsémium : début brutal ou progressif, absence de soif, syndrome grippal

POSOLOGIE

Prescription :

en basse dilution , en granules, à répéter selon la fièvre.

une dose unique en 9CH est parfois bien efficace

Donner ensuite une dose en 12 ou en 15CH si cela ne suffit pas

Dr Françoise SAINT-DIDIER
2005