



## KALIUM PHOSPHORICUM

Présentation du remède : (Phosphate de potassium)

Les mots clés

**IRRITATION**

**ASTHENIE**

**PARESIE**

### **TYPOLOGIE**

- **Psychisme**

Dépression intellectuelle et psychique. Baisse de mémoire. Recherche des mots. Sensation de vide cérébral, avec fatigabilité intellectuelle. Tristesse, découragement, manque de confiance en soi. Peur de la foule, solitude. Volonté en baisse. Indécision. Hypersensibilité au bruit, au toucher, à la douleur.

- **Type sensible (ou physique)**

Maigreur progressive avec creusement de la face. Les yeux sont enfoncés dans les orbites. Asthénie physique. Fatigabilité importante. Bâillements, soupirs. Pleurs en parlant de son état. Agitation nerveuse des pieds. sueurs abondantes.

### **PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE**

#### **L'expérimentation**

##### **Dans la sphère nerveuse**

Grande dépression et épuisement  
Parfois véritable adynamie

##### **Dans la sphère musculaire**

Asthénie parfois jusqu'à la paralysie

##### **Au niveau du sang**

Anémie plus ou moins marquée

### **SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES**

**Stomatite** avec grande sécheresse de la bouche, sans soif, langue sèche, recouverte d'un enduit brunâtre comme de la moutarde ; **Gingivite avec saignements**. Tendance **ulcérate** ; amygdales gonflées avec **fausses membranes blanches**.

#### **Appareil respiratoire.**

Coryza avec **sécrétions jaunes d'or ou orangé**, épaisses, fétides. Croûtes jaunâtres dans les narines. Ecoulement de sécrétions épaisses dans le cavum. .Eternuements à l'air froid. Enrouement. Toux d'irritation trachéale.

#### **Appareil digestif**

Atonie gastrique avec tendance à **la ptose**. Avant les repas : sensation de vide à l'estomac avec fringale, améliorée en mangeant. Après les repas : sécheresse de la bouche et de la langue, sensation de pesanteur gastrique.



**Diarrhée de couleur jaune orangée**, fétide, épuisante, aggravée pendant les repas ou le matin de bonne heure

**Dépression neuropsychique.**

Hypersensibilité, spasmes, algies. Sensation de vide. Mémoire défaillante. Concentration difficile et qui fatigue. Découragement, indécision, par manque de confiance en lui. Manque de volonté. Bâillements, soupirs.

**Troubles neurologiques**

**Céphalées** aggravées par l'effort intellectuel, occipitales et orbitaires avec trouble de l'accommodation aggravation au réveil et par les secousses. Amélioration par la marche lente, au grand air, en mangeant.

Vertiges aggravés en regardant le soleil.

Insomnie avec lenteur pour se réveiller le matin. Terreurs nocturnes chez l'enfant qui a un caractère grognon et pleurnicheur.

Spasmes localisés ou généralisés

**Névralgies** avec agitation et hypersensibilité au bruit et à la lumière suivie parfois de sensation de froideur générale et tachycardie. Névralgie faciale améliorée par les applications froides et sciatique qui s'accompagne d'engourdissement du membre affecté.

Parésie, puis paralysie musculaire avec ou sans atrophie.

Parésie visuelle (accommodation). parésie vocale. Parésie vésicale avec incontinence d'urine.

.Il n'y a plus de larmoiements

impuissance sexuelle, avec pollutions fréquentes et épuisantes.

**MODALITES**

• **Aggravation**

Efforts physiques ou intellectuels.

Après le coït

Par le bruit ,la lumière.

Par le froid.

• **Amélioration**

Pendant les repas.

Par les excitations ou émotions joyeuses.

Par la chaleur.

Par un sommeil bon et prolongé.

• **Causalités (suite de)**

Suite de surmenage intellectuel, nerveux, excès sexuels, soucis ou chagrins prolongés.

• **Désirs et aversions**

Désir de repos, d'alimentation, de promenade au grand air. Désir de distractions joyeuses.



- **Sensations**

De vide à l'estomac, améliorée en mangeant ,suivie de pesanteur gastrique après les repas.

De démangeaison à la paume de la main et plante des pieds.

### **PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES**

Etats dépressifs, asthénie psychique et physique avec insomnie ,spasmes ,névralgies.

Atteinte infectieuse rhino-pharyngée et bronchique avec **aspect jaune d'or des sécrétions.**

Haleine fétide :aggravation avant et après un repas

Troubles digestifs améliorés en mangeant.

**Diarrhée jaune orangé, fétide, épuisante.**

### **COMPARAISONS**

Amélioration en mangeant, Aggravation par l'effort intellectuel :  
ANACARDIUM

Asthénie marquée, irritabilité :

CALCAREA PHOS : moins d'hyper sensibilité au bruit, au toucher, inappétence, peu ou pas d'aggravation par le coït.

NATRUM MUR :appétit conservé, plus de frilosité. Intolérance au soleil, amaigrissement, peu d'aggravation par le coït.

Asthénie mais pas d'irritabilité

NATRUM CARB :sensibilité au bruit, pas au toucher. Plus de frilosité, intolérance au temps chaud et au soleil.

PHOSPHORIC ACID. : Moins ou pas d'aggravation par l'effort intellectuel

AGARICUS :torpeur intellectuelle.

CHINA :plus frileux ,anémié.

SELENIUM :agg temps chaud.

MAGNESIA CARB :plus d'asthénie physique qu' intellectuelle, maigreur , frilosité

Pas d'irritabilité

ZINCUM (moins hyper sensible. Aggravation par le manque de sommeil)

PHOSPHORIC ACID(plus d'indifférence). Dépression neuropsychique

### **POSOLOGIE**

Dilution d'autant plus élevée qu'il y a de signes psychiques : 9, 15, 30CH

**JP MORIN**