

# **PATHOLOGIE URINAIRE**

## **Les infections urinaires**

### **1/ rappel clinique**

**Définition** : Elles sont proprement bactériologiques. Il y a infection lorsque l'on dénombre plus de 100.000 germes par ml dans les urines du matin.

Elles sont très fréquentes et la plupart asymptomatiques.

Le germe en cause est le plus souvent l'escherichia coli, viennent ensuite le proteus mirabilis et des klebsielles.

### **Cas particulier de la grossesse**

Il existe normalement pendant la grossesse une stase urinaire avec dilatation des cavités hautes surtout marquée à droite (compression par l'utérus gravide en dextro position fréquente), intervient également le péristaltisme de l'uretère, diminué par la progestérone. Parfois des lésions préexistantes (lithiase, malformation) sont des causes favorisantes.

### **Plusieurs possibilités**

#### **La bactériurie asymptomatique**

Signes d'appel : protéinurie modérée et isolée, existence d'une pathologie vasculaire, d'un diabète, d'antécédents d'infection urinaire.

Pendant la grossesse, étant donné les possibles complications obstétricales, accouchement prématuré, hypotrophie foetale, on sera souvent conduit à prescrire une antibiothérapie (amoxicilline 1gr5 , 2 fois par jour pendant 3 jours ou traitement minute (amoxicilline 3gr. Ou monuril 1 sachet). Le traitement sera poursuivi pendant 5 à 10 jours au cours des infections vésicales aiguës.

#### **La pyélonéphrite aiguë :**

Elle associe des éléments évocateurs :

- douleurs lombaires, parfois très vives, latéralisées à droite presque toujours.( diagnostic différentiel avec appendicite, cholécystite)
- Fièvre souvent élevée
- Un état général conservé mais dans quelques formes graves, un état toxi-infectieux sévère.

Le traitement de la pyélonéphrite gravidique nécessite une prise en charge spécialisée. Céphotaxime IV (1 à 2gr toutes les 8 heures) ou gentamicine (3mg/kg/j.). Le relais par la voie orale est possible par oroken 200mg 2fois par jour.

#### **Les cystites :**

Il faut vérifier que les douleurs sus-pubiennes, les pollakiuries, les mictions impérieuses, parfois même une hématurie terminale relèvent bien d'une infection et que les critères bactériologiques sont réunis.



## 2/Traitement en homéopathie

### **Apis Mellifica:** douleurs congestives brûlantes

Urines rares fétides avec albumine et sang

Douleurs piquantes brûlantes avec les signes généraux du remède = absence de soif, inflammation, fièvre élevée, tendance aux oedèmes .

Ne peut uriner sans aller à la selle .

Albuminurie, hématurie .

Par exemple, rétention aiguë inflammatoire pendant la grossesse .

### **Benzoïc Acid**

Urines foncées de très mauvaise odeur(d'ammoniac), qui imprègne les vêtements

Urine goutte à goutte et ... prédisposition à la goutte

### **Berbéris**

Douleur coupante dans la vessie , qui descend dans l'urètre

Diarrhée jaunâtre ou constipation avec selles qui s'émettent

Sensibilité nette angle costo-lombaire gauche

Douleurs du dos, aggravées par la pression, qui irradient vers le bas

Urines parfois abondantes et claires, parfois rares et foncées

**Cantharis** : cystalgies et urétralgies avec douleurs brûlantes, coupantes avant, pendant, après la miction de quelques gouttes d'urine foncée. sensation de plaie à vif, ténesme rectal et vésical. persistance d'une douleur qui fait crier, intolérable

Urines foncées parfois hématuriques.

Besoins urgents et fréquents douloureux d'uriner

Excitation sexuelle

Douleurs +++ dans bas ventre et au creux des reins, avant pendant et après la miction

Amélioré par les applications froides, la friction

Aggravé par le café, le toucher, en urinant et après avoir uriné.

15 ou 30 CH : 3 gr après chaque miction douloureuse

**Capsicum** : Cystalgies brûlantes et constrictives avec ténesme vésical et rectal.

Grande frilosité. joues rouges

Brûlures à l'orifice vésical .

Irritabilité, nostalgie du pays, déracinement

### **Chimaphylla**

Filaments blanchâtres dans les urines . Urines troubles, sanglantes

Efforts avant d'uriner . Sensation « comme d'une balle » dans le périnée

Doit uriner avec les pieds écartés et penché en avant



### **Copaiva**

Reflets verdâtre . Urine goutte à goutte

### **Dulcamara**

Cystite après avoir pris froid par temps humide, après avoir pataugé dans l'eau .

Hématurie en fin de miction

### **Equisetum Hiemale**

Douleurs vésicales avec plénitude, pesanteur non améliorée par la miction  
Urines abondantes, foncées . Douleur plus accentuée en fin de miction

### **Eupatorium purpureum**

Douleurs lombaires irradiants à la vessie et à l'urètre . Brûlures à la miction (qui est assez abondante) . Fièvre par accès avec courbatures.

Souvent indiqué chez la femme enceinte.

3 gr après chaque miction douloureuse ou poussée de fièvre  
en 9 CH (S. Gén.) ou 15 CH (S. psychiques) .

**Mercurius Solubilis** : urines brûlantes, glaireuses, foncées, sanguinolentes, pruriantes et fétides.

Brûlure au début de la miction

L'urine provoque des démangeaisons périnéales améliorées par le lavage à l'eau froide

Avec les SG (symptômes généraux) du remède

**Mercurius corrosivus** : les symptômes inflammatoires sont accentués

Urine brûlante passant goutte à goutte

Ténésme, faux besoins . Sang dans les urines . Aggravation nocturne

Douleur aussi intense que Cantharis . Sueurs +++ qui ne soulagent pas .

Hypersalivation, soif

**Nux vomica** : besoins d'uriner urgents et inefficaces, le malade fait des efforts violents et douloureux pour uriner seulement quelques gouttes.

Aggravé le matin, au réveil, après avoir absorbé des stimulants, des épices, par le contact.

Frissons au moindre mouvement.

### **Pareira Brava**

Besoin d'efforts violents pour uriner . Nécessité de se mettre à genoux pour uriner

Douleurs irradiant de la vessie vers les cuisses

### **Petrolisénum**

Sensations de démangeaisons internes . Envie brutale d'uriner avec douleur

### **Pulsatilla**

Urines rares, sanglantes . Douleurs avant, pendant et après la miction

Envie impérieuse d'uriner . Pression vésicale, miction involontaire

Fréquent pendant la grossesse . Tempérament doux, pleurnichard



**Sarsaparilla** : pollakiurie et douleurs spasmodiques et intolérables en fin de miction

Frissons après la miction. Urine librement en se tenant debout

Douleurs intenses dans les reins, « au niveau du rein droit.

Urines troubles avec dépôt blanchâtre. Parfois incontinence

. Urines rares, rouges

Les gens « Sarsaparilla » sont très attachés à la terre et aux biens des ancêtres

### **Sepia**

Inflammation de la vessie . Sédiment rouge dans l'urine

« Bearing down » = pesanteur bas ventre, comme si les organes allaient sortir

Laisse échapper l'urine pendant le 1<sup>er</sup> sommeil

Aggravation pendant les règles, pendant les rapports sexuels

**Staphysagria** : besoins d'uriner toutes les heures chez les « jeunes mariées », après le coït, après un travail laborieux.

Grande sensibilité des parties génitales

Douleurs brûlantes dans l'urètre dans l'intervalle des mictions, cesse en urinant. Sensation d'une goutte d'urine s'écoulant continuellement dans le canal.

Amélioré par le repos de la nuit

Cystite après endoscopie, sondage .

Suite de refoulement, de colère réprimée, d'indignation, d'humiliation

**Térebenthina** : Pollakiurie et cystalgies brûlantes.

Urines peu abondantes, brunâtres, sanguinolentes, à odeur de violette.

Douleurs tiraillantes et brûlantes dans la région lombaire

Parfois sensation d'écartement de la symphyse pubienne.

Hématurie noirâtre, marc de café . Douleur de la « loge rénale » (remède de pyélonéphrite) .

### **3/ Posologie**

Comme toujours, donner une dilution d'autant plus élevée qu'il y a de Signes Généraux et de Signes Psychiques.

Il peut être judicieux de répéter le remède après chaque miction douloureuse.

Si on reconnaît les signes psychiques d'un remède de façon nette( même si il n'est pas cité plus haut), c'est celui-ci qu'il faut donner.

### **Coliques néphrétiques**

(Dr DUSART Catherine )

Rubriques du kent:

Rein : Lithiase : 20 remèdes

Rein : Douleurs : en fonction de leurs caractéristiques et irradiations

Quelques remèdes connus pour cet usage :



**Belladonna**

Douleur lombaire paroxystique **battante** aggravée au **moindre toucher et aux secousses**

**Berbéris**

Douleur élançante aggravée au mouvement et aux secousses ,**irradiant à la vessie** , à la hanche ou à la **cuisse** ; généralement à **gauche**

**Lycopodium**

Douleur généralement à **droite** (polarité droite du remède)

Douleur pénible dans la région lombaire **soulagée par la miction**

Dépôt de **sable rouge** dans les urines

**Sarsaparilla**

Douleur lombaire droite avec **ténesme** et faux besoin . Doit uriner debout

**Pareira brava**

Colique néphrétique avec signes de cystites : besoin constant d'uriner et urine goutte à goutte

Le patient est incapable d'uriner à moins de **s'accroupir**

Mme Sylvie de SIGALONY, sage femme  
Dr DUSART Catherine  
Dr F SAINT-DIDIER