

PREPARATION A L'INTERVENTION CHIRURGICALE

REMEDES ANXIETE	PREVENTION HEMORRAGIE	AUTRES
<p>ACONIT:sujet sténique, vite affolé Peur irraisonnée, peur de la mort Tendance à HTA 15 ou 30ch</p> <p>IGNATIA Sujet hyperémotif Caractère paradoxal des symptômes Hypersensibilité bruits, odeurs, soupirs, oppressions, bâillements</p> <p>MOSCHUS Manifestations hystériques et théâtrales</p> <p>ACTAEA RACEMOSA Passe d'un sujet à l'autre Précordialgies, crampes Peur de la mort, de l'accouchement</p> <p>GELSEMIUM Trac par anticipation Diarrhée motrice Inhibition Besoin fréquent d'uriner Aggravation en y pensant Tremblements Insomnies</p> <p>Dans tous les cas : 15 ou 30CH Par exemple, une dose en 15ch puis une dose en 30ch à la réapparition des symptômes</p>	<p>PHOSPHORUS 1dose 15ch 1 semaine avant ou avant de partir à l'hôpital ou maternité chez des sujets passionnés, sentimentaux, minces, élancés, sujet aux épistaxis</p> <p>CHINA Chez des sujets qui saignent facilement plutôt indécis malgré une multitude de projets Hémorragies de sang foncé, ballonnements</p> <p>CROTALUS HORRIDUS Hémorragies de sang noir Déficits plaquettaires Sujet certains d'avoir le point de vue juste</p> <p style="text-align: center;">PREVENTION INFECTION</p> <p>PYROGENIUM Eventuellement 3gr en 5ch 1 fois par jour pendant la semaine qui suit l'intervention ou l'accouchement Prostration, dissociation pouls et température</p> <p>HEPAR SUFUR 1 dose 15 ou 30ch Sécrétions purulentes importantes, fétides Sensibilité au toucher, au froid. Frilosité</p> <p>SILICEA : suppuration trainante 15 voir 30CH</p>	<p>OPIUM 15CH : pour faciliter la réapparition des selles</p> <p>RAPHANUS 5CH : pour faciliter réapparition des gaz</p> <p>STAPHYSAGRIA 15 ou 30CH pour faciliter cicatrisation et faire disparaître sentiment de frustration</p> <p>FLUORIC ACID : en cas de cicatrice chéloïdes</p> <p>GRAPHITES : cicatrices avec adhérences en profondeur</p> <p>Localement sur cicatrice : CALENDULA TM</p>

EN POST – OPERATOIRE

NUX VOMICA, voire **THUYA** permettront de drainer et d'éliminer anesthésie et médicaments allopathiques donnés à l'intervention

DOULEUR :

ARNICA

Maître remède de tout traumatisme, **à prescrire systématiquement** : Douleurs, avec sensation de courbature, recherche constante d'une bonne place ou position.

Le corps est endolori et meurtri, avec **aggravation** au moindre contact.

Remède de contusion et d'hématome, Arnica limitera les risques d'hémorragie, œdème, thrombose et accélèrera la cicatrisation.

HYPERICUM

Lorsque les douleurs sont névralgiques, par traumatisme des nerfs. Très utile **après soins dentaires**.

BELLIS PERENNIS

Remède de **congestion pelvienne** après traumatisme, sensation de brisure douloureuse dans la bas ventre. **Ecchymoses** très sensibles au toucher.

COMPLICATIONS :

APIS MELLIFICA

Pour les **œdèmes** post opératoires, notamment de la face

PYROGENIUM

Remède de **surinfection**, quasi-systématique si **fièvre**.

CHINA Asthénie, suite de perte de liquides organiques.

Ballonnements abdominaux considérables.

Hémorragies. **Aggravation** par le moindre contact.

ANTIMONIUM TARTARICUM

Remède à tropisme bronchique, préférentiel, il aidera les **insuffisants respiratoires** à expectorer puis à tarir leur bronchorrhée résiduelle.

OPIUM

Facilite la **reprise du transit**, grand remède d'atonie, d'absence de réaction. Sueurs chaudes mais extrémités inférieures froides. **Rétention d'urine**. **Suite de peur**. Désire être découvert.



RAPHANUS

Tympanite généralisée avec impossibilité d'émettre des gaz, gastriques ou intestinaux.

CICATRISATION :

STAPHYSAGRIA

Facilite la **cicatrisation**, notamment des plaies chirurgicales, linéaires.

FLUORIC ACID

Action profonde sur le **tissu osseux, veineux** et sur la **peau**. Cicatrices chéloïdes.

GRAPHITES

Plaie cicatrisant difficilement, suppurant facilement. **Adhérences** en profondeur

CALENDULA

Action externe et interne sur les plaies traumatiques, produisant la **cicatrisation rapide** et **empêchant la suppuration**. C'est l'**antiseptique homéopathique** !