



VOMISSEMENTS

<i>Par indigestion</i>	<i>Par intolérance alimentaire</i>	<i>gravidiques</i>
<p>ANTIMONIUM CRUDUM 5,7 ou 9 CH sujet qui mange vite, beaucoup distension abdominale langue blanche ++ éructations ++ vomissements qui ne soulagent pas Agg été</p>	<p>Œufs FERRUM MET : vomissements dès ingestion COLCHICUM : brûlures d'estomac</p>	<p>SEPIA Anorexie Nausée à odeur, vue des aliments, le matin au lever Tiraillements de l'estomac Masque de grossesse Tendance dépressive</p>
<p>PULSATILLA 9 CH - 2 à 3 fois/jour après aliments gras ou glaces poids sur l'estomac acidité langue blanche</p>	<p>Choux BRYONIA : amél par repos Sécheresse bouche, soif ++ PETROLEUM : faim la nuit, désir de bière</p>	<p>COLCHICUM Hypersensible aux odeurs</p>
<p>NUX VOMICA 9 CH Repas richement arrosés Lourdeur 1 à 2 h après repas Acidité gastrique</p>	<p>Pâtisseries IPECA 5 CH en fonction des nausées. Vomissements qui ne calment pas</p>	<p>IGNATIA Nausées améliorées en mangeant</p>
<p><i>Par intoxication alimentaire</i></p>	<p>Huîtres : LYCOPodium</p>	<p>NUX VOMICA Brûlures estomac Agg café, tabac, alcool</p>
<p>ARSENICUM ALBUM 9ou15CH après chaque vomissemnt brûlure estomac, abdomen soif. anxiété. Peur mort diarrhée putride brûlante</p>	<p>Fraises : OXALIC ACID</p>	<p>BRYONIA amélioré au repos</p>
<p>BELLADONNA Suite de viande avariée Congestion céphalique. fièvre Brûlures muqueuses. Sueurs</p>	<p>Lait ++ chez le nourrisson AETHUSA CYNAPIUM Diarrhée lait de vache, vomissements, amaigrissement CALCAREA CARBONICA Éructations, régurgitations lait caillé. « Bébé Cadum » SILICEA Enfant maigre, nerveux Vomissements, diarrhées Sueurs tête, pieds VALERIANA Chez enfant dont la mère est nerveuse Hoquets, spasmes digestifs Caillots de sang dans selles MAGNESIA CARB Diarrhées verdâtres chez enfants plus nerveux que Calc. Carb. avec même aspect MAGNESIA MURIATICA Vomissements pendant poussée dentaire. Constipation CARBO VEGETABILIS Flatulence, gaz intestinaux Éructations. État nauséux</p>	<p>IRIS VERSICOLOR Pyrosis 2^{ème} moitié grossesse</p>
<p>CAMPHORA Suite champignons, moules Collapsus, froid glacial Agg chaleur. Besoin air Choléra (avec Ver. Alb. et Cupr.)</p>		<p>KREOSOTUM Rejet aliments non digérés avec brûlures</p>
<p>PYROGENIUM Fétilité++ des sécrétions État septicémique Courbatures meurtries</p>		<p>SYMPHORICARPUS RAC. Agg nuit, inappétence, fatigue Vom. persistant pendant grossesse</p>
<p><i>Dr F. SAINT-DIDIER. 2005</i></p>		<p>Mal des transports</p>
		<p>COCCULUS INDICUS Aggravation air frais Amélioration air confiné</p>
		<p>TABACUM Pâleur. - Amélioration air frais Sueurs froides</p>
		<p>PETROLEUM Hyper salivation Amélioré en mangeant, en fermant les yeux</p>
		<p>BORAX Sensible aux mouvements de descente (avion)</p>



VOMISSEMENTS

Les vomissements sont un symptôme d'un état aigu ou chronique du patient.

*Nous distinguerons les **vomissements de l'enfant et du nourrisson**,
des **intoxications diverses** et de **la grossesse**. *Dr Geneviève CHEREAU – 2009**

1 - VOMISSEMENTS DE L'ENFANT

SENNA

Le séné est le principal médicament de l'**acétonémie** parce qu'il provoque expérimentalement des troubles digestifs parfaitement semblables à ceux observés lors de la **crise d'acétonémie** (*La «crise d'acétone» est le plus souvent la conséquence d'une maladie à identifier. L'enfant est fatigué, vomit et son haleine sent l'odeur de la pomme reinette. A jeun, son organisme ne dispose plus suffisamment de glucose. Il brûle alors des graisses, dont l'acétone est le produit de dégradation.*)

- odeur aromatique de l'haleine;
- **nausées, vomissements, coliques et flatulence** ;
- **épuisement** rapide avec **pâleur de la face**.

Sa prescription doit être quasi systématique, **en 5 CH, par prises répétées** toutes les demi-heures ou toutes les heures selon l'acuité du cas. On peut alterner ces prises avec l'un ou plusieurs des remèdes suivants selon les modalités réactionnelles du patient:

LYCOPodium CLAVATUM

Généralement employé comme médicament de fond dans ce type d'affection, Lycopodium est utilisé comme médicament de crise aigüe chez des patients maigres, au teint jaunâtre, présentant habituellement des **borborygmes avec flatulence intestinale** souvent douloureuse, **aggravée par les féculents, les œufs et le chocolat**.

Les patients justiciables de ce remède sont souvent aussi nerveux, sujets à l'eczéma et ont fréquemment présenté une dermite du siège avant que la propreté n'ait été acquise.

Prescrire en 5, 7 ou 9 CH, deux à trois fois par jour.

PHOSPHORUS

Les **vomissements** alimentaires sont **abondants et brûlants** pour la bouche et l'œsophage ; ils contiennent souvent de la bile. Il existe une fièvre modérée, des sueurs, de la prostration. La **soif d'eau froide est très vive** mais les boissons vite rejetées; la langue est sèche et rouge. **Prescrire en 9 CH, en alternance avec Senna.**

IPECA

Ce médicament s'emploie dans le cas de **vomissements abondants** avec une **langue propre** ou peu chargée, une **hyper salivation** et une **absence de soif**.

Prescrire en 7 ou 9 CH, après chaque vomissement.



ANTIMONIUM CRUDUM

A prescrire dans le cas de vomissements alimentaires abondants, avec une **langue chargée d'un enduit blanc comme de la craie** et une **soif intense** surtout pour des **boissons acides** ou gazeuses.

Ce tableau s'observe la plupart du temps dans les vomissements acétonémiques **consécutifs aux excès alimentaires**.

Prescrire en 7 ou 9 CH, après chaque vomissement.

AETHUSA CYNAPIUM

Intolérance du nourrisson **pour le lait de vache** qui est rejeté aussitôt bu ou après quelque temps. L'enfant n'a **pas soif**, refuse le biberon et se retrouve **prostré, fatigué**.

2 - VOMISSEMENTS par EXCÈS ALIMENTAIRE ou INFECTION.

NUX VOMICA

Contenant de la strychnine et de la brucine responsables expérimentalement de spasmes antipéristaltiques, ce médicament est utilisé devant des **nausées**, des **régurgitations** et des **vomissements acides qui soulagent**, à la **suite d'abus** alimentaires ou de boissons. **Prescrire en 7 ou 9 CH** au moment des nausées.

ANTIMONIUM CRUDUM

Ce médicament s'emploie devant des éructations ayant le goût des aliments chez des individus se plaignant de **sensations de plénitude et de pesanteur gastriques**, à la suite de l'**absorption** gloutonne **d'une trop grande quantité d'aliments**.

La **langue** est **très chargée**, recouverte d'un enduit épais, blanc laiteux.

Rapidement surviennent des nausées suivies de vomissements contenant des débris alimentaires.

Les **selles** ont un aspect **mi-solide, mi-liquide**.

**** Une prise d'**ANTIMONIUM CRUDUM** et/ou **NUX VOMICA** en 7 ou 9 CH à titre préventif, avant de se livrer à des excès de boissons alcoolisées, facilite la digestion, diminue la sensation d'ébriété et évite la désagréable sensation de "gueule de bois" du lendemain matin.*

IPECA

Le malade présente ici des **vomissements qui ne soulagent pas**, des **nausées perpétuelles**.

La **langue** est **propre**, toujours maintenue humide par une **hypersalivation**.

Le malade n'a **pas soif**.

Les selles sont accompagnées de **ténésme**.

Elles peuvent être fermentées, vertes, écumeuses, parfois sanglantes.

Prescrire en 7 ou 9 CH répétés d'autant plus fréquemment que l'intensité des symptômes est plus grande.



3 - VOMISSEMENTS avec VERTIGES

COCCULUS INDICUS

Son action pathogénétique est surtout sous la dépendance de son principal alcaloïde, la picrotoxine, poison violent du **système nerveux central**, plus particulièrement de la VIII^e paire crânienne et des fibres motrices de la moelle. Ce médicament est indiqué devant des **nausées et des vomissements avec sensation de violents vertiges et des bâillements**, pouvant être associés à une **grande lassitude**. Ces symptômes sont **aggravés par les excitations visuelles, par les odeurs fortes** (tabac) et **par le manque de sommeil**. Ils sont **améliorés par la chaleur**.
Prescrire en 7 ou 9 CH, deux fois par jour.

TABACUM

Le tableau clinique correspond ici à celui de la **grande crise vagale** :

- **pâleur puis sialorrhée, sueurs froides** ;
- **nausées ou vomissements** ;
- **palpitations avec vertiges** et impression de **défaillance**.

Il existe parfois une diarrhée concomitante avec sensation de froid dans l'abdomen.

Le malade est **aggravé au moindre mouvement et à la chaleur** ;
amélioré au grand air frais ou en fermant les yeux.

Prescrire en 7 ou 9 CH, deux fois par jour.

4 - VOMISSEMENTS DE LA GROSSESSE

Les vomissements au cours des trois premiers mois de la grossesse représentent une pathologie le plus souvent banale mais inconfortable pour la femme enceinte. Dans certains cas, ces vomissements peuvent être incoercibles, entraînant alors une déshydratation et un tableau de dénutrition sévères qui nécessitent un isolement strict et une alimentation parentérale en milieu hospitalier.

*La plupart du temps, les nausées et les vomissements sont fréquents, avec des **modalités caractéristiques** : **aggravation par le mouvement actif ou passif, aggravation par la vue et ou par l'odeur des aliments**, hypersialorrhée (hyper salivation), spasmes du tractus digestif, sensations lipothymiques (malaise).*

*Le **traitement homéopathique** permet d'observer une **cessation rapide des troubles, sans effets secondaires pour la mère et le fœtus**.*

Les médicaments peuvent être choisis parmi les substances suivantes :

COCCULUS et **TABACUM** - déjà vus plus haut



SEPIA

Quel que soit leur mode réactionnel habituel, la plupart des femmes enceintes présentent au cours de leur grossesse des symptômes correspondant à la pathogénésie de Sepia.

En effet, pendant les premiers mois, on trouve :

- une **sensation de vide gastrique qui n'est pas soulagée en mangeant** ;
- des **nausées à la vue et à l'odeur de la nourriture** ;
- des **nausées matinales avant le petit déjeuner** ;
- un **dégoût pour la fumée du tabac** ;
- des **vomissements après les repas** ;
- un **désir d'aliments acidulés ou vinaigrés** et de condiments ;
- des **brûlures gastriques avec un mauvais goût dans la bouche**.

Prescrire en 7 ou 9 CH deux fois par jour,

arrêter le traitement dès que les symptômes disparaissent.

IPECA

Deux éléments dominent la pathogénésie d'Ipeca:

- un élément **vagotonique** avec **nausées constantes, pâleur du visage, cernes bleuâtres autour des yeux, bradycardie, hypotension artérielle, sueurs, hypersécrétion digestive** ;
- un élément **spasmodique** avec **vomissements fréquents de mucus mousseux**.

Ces deux éléments sont valorisés par des **modalités caractéristiques** :

- les **vomissements ne calment pas la nausée** ;
- la **langue reste propre** ou peu saburrale, **très humide** du fait de l'hypersialorrhée ;
- une **absence de soif** est régulièrement observée ;
- les **nausées sont aggravées par le mouvement**.

Prescrire en 7 ou 9 CH, au rythme des nausées.

COLCHICUM

L'odeur de la nourriture provoque des nausées accompagnées d'hypersialorrhée et de sensations lipothymiques.

Les vomissements contiennent beaucoup de mucus et de bile ils sont **aggravés au moindre mouvement** et la femme enceinte décrit une **sensation de froid au creux épigastrique**.

Il existe une **intolérance aux œufs et aux poissons**.

Prescrire en 5 CH deux ou trois fois par jour, **avant les repas**.

BRYONIA ALBA

Souvent bilieux, les **vomissements** sont **déclenchés par le mouvement** et diminuent avec l'immobilité.

La **bouche est sèche** et la **soif intense**.

Nausées et vomissements apparaissent **dès le saut du lit**.

Prescrire en 7 ou 9 CH deux ou trois fois par jour.



KREOSOTUM

La **fin des repas** est l'occasion de **pyrosis** ;

assez longtemps après, se produisent des **vomissements brûlants d'aliments non digérés**.

Prescrire en 5 ou 7 CH, avant le repas.

IRIS VERSICOLOR

Sa pathogénésie est très proche du précédent;

il est plus indiqué en cas de **migraines concomitantes**.

Prescrire en 5 ou 7 CH, avant le repas.

LOBELIA INFLATA

Comme pour Tabacum, on trouve un tableau de grande crise vagale,

mais les modalités sont différentes: - **aggravation le matin au réveil et la nuit**;

- **amélioration en buvant un peu**.

Prescrire en 7 ou 9 CH, deux fois par jour.

IGNATIA AMARA

Médicament de **spasmes** et de **modalités paradoxales**, il est utile chez des femmes **anxieuses, hypersensibles**, décrivant des **sensations de striction au niveau du cou ou du creux épigastrique, améliorées** temporairement par un **soupir profond**. Les nausées sont **améliorées en mangeant ou par la distraction**.

Ce médicament, prescrit surtout sur des **particularités comportementales**, donne des résultats fidèles en 9 CH, une à deux fois par jour (au réveil et au coucher).

NUX VOMICA

D'un emploi assez rare dans les nausées de la grossesse, ce médicament se justifie lorsque ces **nausées** surviennent **après les repas** et qu'il existe une **intolérance gastrique au café** avec, de plus, les signes généraux du médicament (en particulier **besoin incoercible de sieste, hypersensibilité nerveuse, insomnie au milieu de la nuit**).

Prescrire en 9 CH avant les repas.

SULFURIC ACID

Pyrosis, reflux gastro-œsophagien avec **vomissements acides** et **brûlures** jusqu'à la bouche / < **Aggravation par l'alcool, le café**

IRIS VERSICOLOR

Reflux brûlant avec **vomissements acides, brûlants, glaireux, brûlures de tout le tube digestif de la bouche à l'anus**.

Migraine ophthalmique périodique souvent hebdomadaire **avec vomissements brûlants**.

CARDUUS MARIANUS

Nausées, **vomissements acides et bilieux** sur insuffisance hépatique, cirrhose, **hépatomégalie, splénomégalie**.

Subictère, **nausées à la palpation de l'épigastre et de l'hypochondre droit**. **Dr G. CHEREAU**