



COCCUS CACTI

La cochenille du Mexique

Un mot à retenir : **COLLE, COLLANT**

Comme une chenille, si on veut la retirer d'une feuille, elle va faire le « dos rond » et s'agripper par les deux bouts, comme de la colle qui sort d'un tube.

Monsieur ou Madame COCCUS CACTI, c'est un *pot de COLLE*. C'est celui dont vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser facilement quand vous jugez que la consultation est finie, qui va vous secouer la main une bonne dizaine de fois avant de la lâcher et de sortir. C'est un affectueux qui aime embrasser au point d'en être agaçant pour les autres, « **collant** ».

ACTION PATHOGÉNÉTIQUE

Importante irritation de la muqueuse respiratoire avec abondantes mucosités filantes et épaisses, **collantes**.

Hémorragies de sang noir et filamenteux.

SIGNES CARACTÉRISTIQUES

RESPIRATOIRES : - **toux** quinteuse coqueluchoïde par chatouillement laryngé avec expectoration de mucus filant et visqueux, **COLLANT**, épais. Les mucosités pendent en longs filaments. Elles étouffent le nourrisson. Visage pourpre et état nauséux pendant la quinte (nausées par le caractère **COLLANT** des mucosités)

- **rhinite** avec écoulement ayant les mêmes caractéristiques :

COLLANT, filant, visqueux, abondant, difficile à expulser.

HÉMORRAGIES : de sang noir filamenteux, **COLLANT**, poisseux, épais.

Les hémorragies concernent principalement les règles et les urines

HYPERESTHÉSIE DES MUQUEUSES :

Douleur à la gorge après avoir craché

Démangeaison laryngée intense réveillant le malade et entraînant la toux

Douleurs au moment de l'expulsion des caillots (urinaires ou utérins)

MODALITÉS

La TOUX est aggravée le soir vers 23 h et le matin au réveil. Elle est aggravée par la chaleur (chambre et boissons chaudes) et en se brossant les dents. Elle est améliorée dans une chambre froide ou en buvant de l'eau froide et par le rejet des mucosités.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

La coqueluche

Les toux spasmodiques, coqueluchoïdes

Les toux après un vaccin contre la coqueluche

Les hémorragies de sang noir comme décrit précédemment



PRESCRIPTION

Un à trois granules de 5 à 9 CH après chaque quinte ou 2 à 4 fois / jour en fonction des signes hémorragiques ; la règle étant, comme toujours, de donner une dilution d'autant plus élevée qu'il y a de signes généraux et même une 15 ou une 30 CH si on a les signes psychiques.

Dr Françoise SAINT-DIDIER