



## Préparation à l'INTERVENTION CHIRURGICALE

REMÈDES ANXIÉTÉ	PRÉVENTION HÉMORRAGIE	AUTRES
<b>ACONIT</b> : sujet sthénique, vite affolé Peur irraisonnée, peur de la mort Tendance à HTA 15 ou 30 CH	<b>PHOSPHORUS</b> 1 prise en 15 CH 1 semaine avant l'intervention ou juste avant de partir à l'hôpital ou à la maternité, chez des sujets <b>passionnés, sentimentaux</b> , minces, élancés, sujets aux épistaxis	<b>OPIUM</b> 15 CH : pour faciliter la réapparition des selles
<b>IGNATIA</b> Sujet hyperémotif Caractère paradoxal des symptômes Hypersensibilité bruits, odeurs, soupirs, oppressions, bâillements	<b>CHINA</b> Chez des sujets qui saignent facilement, plutôt <b>indécis malgré une multitude de projets</b> Hémorragies de sang foncé, ballonnements	<b>RAPHANUS</b> 5 CH : pour faciliter réapparition des gaz
<b>MOSCHUS</b> Manifestations hystériques et théâtrales	<b>CROTALUS HORRIDUS</b> Hémorragies de sang noir Déficits plaquettaires <b>Sujets certains d'avoir «le point de vue juste»</b>	<b>STAPHYSAGRIA</b> 15 ou 30 CH pour faciliter la cicatrisation et faire disparaître le sentiment de frustration
<b>ACTAEA RACEMOSA</b> Passe d'un sujet à l'autre Précordialgies, crampes Peur de la mort, de l'accouchement	<b>PRÉVENTION INFECTION</b>	<b>FLUORIC ACID</b> : en cas de cicatrices chéloïdes
<b>GELSEMIUM</b> Trac par anticipation Diarrhée motrice Inhibition Besoin fréquent d'uriner Aggravation en y pensant Tremblements Insomnies	<b>PYROGENIUM</b> Éventuellement en 5 CH 1 fois par jour pendant la semaine qui suit l'intervention ou l'accouchement Prostration, dissociation pouls et température	<b>GRAPHITES</b> : cicatrices avec adhérences en profondeur
<b>Dans tous les cas : 15 ou 30 CH</b> <b>Par exemple, une prise en 15 CH puis une en 30 CH à la réapparition des symptômes</b>	<b>HEPAR SUFUR</b> 1 prise en 15 ou 30 CH Sécrétions purulentes importantes, fétides Sensibilité au toucher, au froid. Frilosité	Localement sur cicatrice : <b>CALENDULA TM</b>
	<b>SILICEA</b> : suppuration traînante 15 voire 30 CH	



## EN POST – OPERATOIRE

**NUX VOMICA**, voire **THUYA**

permettront de drainer et d'éliminer anesthésie et médicaments allopathiques donnés à l'intervention

### DOULEUR :

**ARNICA** maître remède de tout traumatisme, à **prescrire systématiquement** :

Douleurs, avec sensation de courbature, recherche constante d'une bonne place ou position.

Le corps est endolori et meurtri, avec **aggravation** au moindre contact.

Remède de contusion et d'hématome, Arnica limitera les risques d'hémorragie, œdème, thrombose et accélérera la cicatrisation.

**HYPERICUM**

Lorsque les douleurs sont névralgiques, par traumatisme des nerfs. Très utile **après soins dentaires**.

**BELLIS PERENNIS**

Remède de **congestion pelvienne** après traumatisme, sensation de brisure douloureuse dans le bas ventre. **Ecchymoses** très sensibles au toucher.

### COMPLICATIONS :

**APIS MELLIFICA** Pour les **œdèmes** post opératoires, notamment de la face

**PYROGENIUM** Remède de **surinfection**, quasi-systématique si **fièvre**.

**CHINA** Asthénie, suite de perte de liquides organiques. **Ballonnements abdominaux** considérables.  
**Hémorragies. Aggravation** par le moindre contact.

**ANTIMONIUM TARTARICUM** Remède à tropisme bronchique, préférentiel,  
il aidera les **insuffisants respiratoires** à expectorer puis à tarir leur bronchorrhée résiduelle.

**OPIUM** Facilite la **reprise du transit**, grand remède d'atonie, d'absence de réaction. Sueurs chaudes mais extrémités inférieures froides. **Rétention d'urine. Suite de peur**. Désire être découvert.

**RAPHANUS** **Tympanite généralisée** avec impossibilité d'émettre des gaz, gastriques ou intestinaux.

### CICATRISATION :

**STAPHYSAGRIA** Facilite la **cicatrisation**, notamment des plaies chirurgicales, linéaires.

**FLUORIC ACID** Action profonde sur le **tissu osseux, veineux** et sur la **peau**. Cicatrices chéloïdes.

**GRAPHITES** **Plaie** cicatrisant difficilement, suppurant facilement. **Adhérences** en profondeur.

**CALENDULA** Action externe et interne sur les plaies traumatiques, produisant la **cicatrisation rapide** et **empêchant la suppuration**. C'est l'**antiseptique homéopathique** !